

**КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭКОЛОГИИ**

КРАСНАЯ КНИГА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения
виды растений
и животных**

Грозный

2007

ББК 28.088.л6
К78

Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. – Грозный, 2007. – 432 с., ил.

Красная книга Чеченской Республики является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны.

В книге описаны виды редких и исчезающих растений и животных Чеченской Республики, нуждающиеся в охране. Указаны экология, закономерности географического распространения (с картами ареалов), роль каждого таксона в растительном покрове и животном населении, факторы, создающие угрозу, и меры, обеспечивающие их сохранение. Для облегчения распознавания растений и поиска их в тексте приводятся рисунки, в конце каждой части – указатели русских и латинских названий видов.

Рассчитана на организаторов практической охраны природы, лесоводов, агрономов, учителей-биологов и географов, студентов и просто любителей природы.

ISBN 978-5-98864-017-2

УДК 502.172(470.661)

© Комитет Правительства Чеченской Республики по экологии
© Южный издательский дом



Класс Птицы

На территории Чеченской Республики выявлено пребывание до 323 видов птиц, относящихся к 19 отрядам. Из них 215 относятся к группе гнездящихся, до 47 видов являются пролетными, 32 вида – зимующими, 25 – залетными. 5 видов полностью исчезли из гнездовой фауны Чечни (тетерев полевой, аист белый, савка, чирок мраморный, скопа). Некоторые из них встречаются только на пролете в период миграций.

Наиболее богато в авиафауне региона представлены воробьиные (129 видов), затем ржанкообразные (52 вида), соколообразные (33 вида), гусеобразные (31 вид), значительно присутствие аистообразных (12 видов), журавлеобразных (13 видов), совообразных (8 видов). Остальные 9 отрядов представлены от 1 до 8 видов каждый. Классификация региональной орнитофауны по группам относительной численности показывает, что среди гнездящихся птиц очень многочисленных видов – 9, многочисленных – 90, обычных – 102, малочисленных – 7, редких – 3, очень редких – 4. У пролетных видов иное соотношение: очень многочисленных – нет, только 22 вида относятся к группе обычных, 12 малочисленных видов, 10 – редких, 3 – очень редких.

Среди зимующих птиц 3 вида многочисленны, 17 видов обычны, 2 вида отнесены к редким и 5 видов – гагары краснозобая и чернозобая, султанка, подорожник и пуночка – очень редкие, встречающиеся периодически и не ежегодно.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является первостепенно важным направлением среди решения проблем охраны животного мира. Ключевой составляющей в этом плане являются кадастровые и мониторинговые исследования фауны, выявление уязвимых видов, особенностей их распространения и факторов, ограничивающих их существование. В число редких и исчезающих птиц нами включено 55 видов. Существенное влияние на стабильность природных популяций птиц республики оказывают как естественные причины, так и антропогенная трансформация среды их обитания. На рубеже 1990-200 гг. новые экономические и социально-политические условия, сложившиеся в республике, резко негативно отразились на природно-ресурсном потенциале и в целом на экологической обстановке. Антропогенная трансформация палеоландшафтов привела к изменению структуры видового состава и численности населения соответствующих им орнитокомплексов. Факторы, связанные с антропогенной трансформацией природной среды, имеют как положительные, так и отрицательные последствия для разных видов экологических комплексов авиафауны.


По силе, скорости и разнообразию воздействия антропогенный фактор приобретает решающее значение. Именно у птиц все изменения обнаруживаются часто намного раньше, чем у других животных, они являются наиболее удобными и надежными индикаторами состояния окружающей среды, ее благополучия.

Некоторые виды, ранее отсутствовавшие, начали активно заселять регион, например, кольчатая горница. У многих видов по разным причинам изменился статус пребывания. Зимующими видами стали малая белая цапля, черный коршун, черныш, чибис, горная трясогузка. Впервые были отмечены камышевка широкохвостая, ремиз обыкновенный. Многие виды стали осваивать новые естественные и антропогенные гнездовые ландшафты региона и соседних территорий: луговой лунь, степная пустельга, красавка, черный дрозд и другие. Впервые на гнездовании в широколиственных лесах предкавказских равнин отмечена желна.

Таким образом, можно отметить в заключение, что авиафауна Чечни в настоящее время не статична и подвержена количественной и структурной динамике.

И.И. Гизатулин, А.М. Батхиев

ГАГАРА ЧЕРНОЗОБАЯ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

Семейство Гагаровые – Gaviidae

Гагара чернозобая европейская – *Gavia arctica arctica* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Размеры крупнее домашней утки. Клюв прямой. Голова и верх шеи пепельно-серые, по бокам шеи и на зобе продольные белые полосы, спина черная с яркими белыми поперечными полосами, брюшко белое. На горле черное пятно [1].

Распространение. Вид имеет циркумполярное и циркумбореальное распространение, населяя тундровую, лесотундровую и лесную зоны РФ от западной границы до бассейна р. Лены и оз. Байкал на востоке. [2].

Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид республики. В прошлом столетии зимовал в большом количестве на Каспии и крупных приморских водоемах [3]. В настоящее время в Чеченской Республике встречается редко и не ежегодно в период миграций и на зимовке. Экспертная оценка численности 20-40 особей на пролете. Территория размещения вида приурочена к крупным озерам (Степная жемчужина, Чебутла) поймы Терека [4].

Особенности биологии. Размножается на озерах среди обширных верховых болот, глухих лесных озерах с пологими, слегка заросшими берегами. Гнезда у уреза воды, в кладке 1-2 яйца. Насиживание продолжается 28-30 дней. Птенцы начинают летать и самостоятельно добывать корм в возрасте 60-70 дней. Питается рыбой, в меньшей степени водными беспозвоночными (у пуховых птенцов они составляют ос-

нову пищи) [1,2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы – беспокойство в период охоты, случайный отстрел.

Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Целесообразно усилить мероприятия по экопросвещению среди местного населения. Запрет весенней охоты.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ПЕЛИКАН РОЗОВЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Peleciformes

Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Пеликан розовый – *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная массивная птица с широкими крыльями и длинным клювом, под нижней челюстью которого находится большой кожистый мешок. Окраска белая с розоватым оттенком, концы крыльев почти черные, на голове небольшой хохол. Размах крыльев до 2 метров. Птенцы темно-бурые. От кудрявого пеликана отличается окраской и отсутствием «гривы» – длинных перьев на затылке [1].

Распространение. Спорадическое. От Румынии по берегам крупных водоемов до стран экваториальной Африки, Сирии, Ирака, северо-западной части Индии. Зимует на юге Каспия, в Иране, Ираке, Африке, Индии. В начале века был обычным на гнездовании в Восточном Приазовье, в долине Маныча и Кумы, дельтах Терека и Волги. В настоящее время в России гнездится только в долине Маныча. На озерах Маныч-Гудило и Маныч в последние два десятилетия гнездится постоянно, периодически на Чограйском водохранилище [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом розовый пеликан регулярно гнезился в плавнях Терека и на озерах вдоль него [3, 4]. В настоящее время вид исчез на гнездовании и отмечается во время кочевок и миграций. Современное территориальное размещение приурочено к крупным водоемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 20-30 особей. Залетная птица встречена в горной части 20 октября 1967 года у с. Вашендорой Шатойского района [5,6].


Особенности биологии. Живут на крупных водоемах. К размножению приступают с третьей декады апреля – начала мая. На оз. Маныч-Гудило основные места гнездования находятся на островах, где их колонии обычно располагаются рядом с колониями чаек, цапель, бакланов и других околоводных птиц. В кладке обычно 2-3 яйца, насиживание 33-39 дней. Питается различной рыбой, которую ловит либо в поверхностных слоях глубокой воды, либо загоняя ее на мелководье. За кормом птицы могут летать за 50 км и далее от мест размножения [1,2].

Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных территорий и мест кормления, недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Приложение 1 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих видов. Необходимо запретить весеннюю охоту. Организация ООПТ на местах пролета - бывших местах гнездования. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [7]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



ПЕЛИКАН КУДРЯВЫЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Пеликан кудрявый – *Pelecanus crispus* (Bruch, 1832)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Оперение белое или сероватое, концы крыльев серо-бурые. Перья на затылке удлинены и курчавятся, образуя «гриву». Размах крыльев около 2 метров. В отличие от близкого вида в оперении нет розовых оттенков. Птенцы буровато-серые.

Распространение. Спорадическое. Юго-восточная Европа, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В европейской части России размножается в Восточном Приазовье, на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги, Терека, Кумы. Зимует на Каспии. [1,2].

Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид республики. Ранее был постоянной гнездящейся птицей поймы Терека и прилегающих озер. [3,4,5,6]. В первой половине XX века вид исчез на гнездовании в республике и отмечается во время кочевки и миграций. Настоящее территориальное размещение приурочено к крупным водоемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 40-70 особей [7].

Особенности биологии. Населяет крупные проточные, полупроточные и стоячие пресные и соленые водоемы. Весенний прилет в марте – начале апреля. Размножение начинается в конце марта – апреле и может продолжаться в зависимости от погодных и иных условий до июня.

В кладке одно – три яйца. Насиживание занимает 32–35

дней. Молодые птицы вылетают в возрасте 2-2,5 месяца. С конца июля птицы сбиваются в стаи и кочуют в районе мест гнездования. Осенний отлет происходит в сентябре и длится около месяца [8].

Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных и кормовых территорий, недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. Запрет весенней охоты. Организация ООПТ на местах пролета – бывших местах гнездования (озера Степная жемчужина, Чебутла). Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [9]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1928; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Птицы СССР, 1968; 9. Гизатулин, Джамирозев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

БАКЛАН МАЛЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae

Баклан малый – *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Заметно мельче других бакланов (с ворону). Окраска буровато-черная с блеском и редкими белыми каплевидными пестринами. Голова и шея темно-коричневые. Голого участка кожи у клюва нет. У молодых горло беловатое. В полете имеет характерную для бакланов крестообразную форму.

Распространение. От Албании и бывшей Югославии на западе до Центральной Азии на востоке, и от северного побережья Каспийского моря до Ирака. В России гнездится в низменной части Дагестана (дельта Терека) и Волги [1,2].

Места обитания и численность. Регулярно кочующий, пролетный и зимующий вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] описывает его как обычную предположительно гнездящуюся птицу водоемов поймы Терека. Л.Б. Беме [4,5] регистрировал его гнездование в районе Кизляра. В настоящее время регулярно встречается в небольшом количестве на степных озерах республики севернее Терека, гнездование не доказано. Ключевые территории – озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 200-300 особей. В мягкие теплые зимы встречаются отдельные особи и небольшие стаи. Во время похолоданий с образованием ледостава откочевывает к югу Каспия. Изредка залетает в предгорную и горную зону республики. Залетная птица встречена на озере Кезеной-Ам (1870 метров н.у.м.) [6,7,8].


Особенности биологии. Населяет внутренние водоемы (озера, рыбоводные пруды, старицы). Гнездится моновидовыми или смешанными с другими птицами колониями и отдельными парами в тростниковых зарослях, кустарниках, на невысоких деревьях. В кладках 4-8 яиц. Питается мелкой рыбой, иногда земноводными. [9].

Основные лимитирующие факторы. Ограниченность кормовых территорий, недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском заповеднике Чеченской Республики. Необходим запрет весенней охоты, организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [10]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Точиев, Гизатулин, 1988; 8. Гизатулин и др., 2001; 9. Птицы СССР, 1968; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ



Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
Цапля египетская – *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Размеры средние для цапель. Клюв и шея сравнительно короткие, голова большая, на голове, шее и спине длинные рассученные перья. Окраска белая с буровато-желтыми перьями на голове, груди и спине. Клюв желтый с красноватым основанием, ноги красноватые. Молодые – чисто белые, клюв черный с желтым концом [1].

Распространение. Спорадически в северо-западном Причерноморье, Азербайджане, странах Малой, Передней, Юго-Восточной Азии, в Индии, Африке, районе Австралии, Северной и Южной Америке. В пределах России гнездится в низовьях дельты Волги и Терека [2,3].

Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид республики. Современное территориальное размещение приурочено к дельтовым зарослям деревьев и тростниковых крепей по нижнему течению Терека и степным озерам – Степная жемчужина и Чебутла. Встречается спорадически во время послегнездовых кочевок и миграций, не ежегодно, в количестве от одной до нескольких особей [4].

Особенности биологии. Обитатель заболоченных низменностей. Перелетная птица. Гнездится колониями вместе с другими цаплями в группах высоких деревьев, среди озер, болот и проток. Гнездо представляет собой рыхлую постройку из тонких сухих веток и прутьев. Кладка в конце

апреля-первой половине мая из 5-7 светлых голубоватых яиц. Питается различными насекомыми, реже лягушками и мелкой рыбой [2].

Основные лимитирующие факторы. Беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходима организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [5].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др., 2000; 4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

КОЛПИЦА

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Ибисовые – Threskiornithidae

Колпица – *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами и шеей. Клюв длинный и плоский, расширяющийся на конце, подобно округлой лопатке. На голове хохол. Оперение белое, хохол желтоватый. Клюв черный с желтым концом, ноги черные. У молодых хохол отсутствует, концы крыльев черные, клюв красноватый. В полете вытягивает и слегка пригибает шею. Полет легкий с планированием. [1].

Распространение. Южная Европа, Северо-Восточная Африка, Передняя и Малая Азия, Индия, Монголия, Китай. Зимует в Африке. В России гнездовый ареал прерывистый, низовья южных рек и озера от Дона до Урала [2].

Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид республики. В прошлом колпица была обычной птицей, населявшей плавни Терека равнинной части республики [3,4]. В настоящее время в небольшом количестве встречается в период весенних и осенних миграций и послегнездовых кочевок на водоемах поймы Терека. Ключевые территории – озера Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык. Экспертная оценка численности на пролете 30-60 особей [5,6].


Особенности биологии. Весенний прилет приходится на III декаду марта – II половину апреля. Размножается колонially, часто в смешанных колониях других околоводных птиц. Гнезда устраивает на открытых косах и о-вах, заламах тростника, представляющих собой конусообразные сооружения (высотой до 100 см и более) из сухих стеблей и листьев тростника, других растений. Яйца появляются со II декады апреля, в кладке их от 3 до 5. В случае гибели кладок и других факторов возможно повторное гнездование. При поздних кладках яйца в гнездах можно обнаружить до середины июля. Кормятся на мелководьях, чаще группами, бентосными организмами, реже моллюсками и мальками рыб. [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, что вызывает сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.



Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8]. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1988 а; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



КАРАВАЙКА



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Ибисовые – Threskiornithidae

Каравайка – *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица (величиной с утку) на высоких ногах. Клюв длинный, заметно изогнутый книзу. Голова, шея и вся брюшная сторона красновато-коричневые. Крылья и хвост черные, с сине-зеленым металлическим блеском. Спина и надхвостье зеленовато-фиолетовые, с блеском. Взрослые птицы зимой и молодые без металлического блеска на оперении [1].

Распространение. Южная Европа, Африка (Тунис и тропические области), Мадагаскар, Южная Азия от Малой Азии до Бирмы и Цейлона, Филиппины, Ява, Австралия и южная часть Северной Америки. В России гнездится в дельтах и поймах рек, на больших озерах Предкавказья и Прикаспия [2].

Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид республики. В прошлом обычная птица, населявшая равнинную часть республики [3, 4]. В 60-х годах прошлого века на Чебугтинских озерах регистрировалась гнездовая колония совместно с рыжей цаплей. В 1982-1987 годах на озерах Степная жемчужина предположительно гнездились 3-4 пары [5]. В настоящее время в небольшом количестве (1-9 особей) встречается в период послегнездовых кочевков (вторая половина июля - август), весенних и осенних миграций на водоемах поймы Терека [6]. Ключевые территории - озеро Степная жемчужина и Чебугтла, урочище Киссык. Экспертная оценка численности на пролете в настоящее время 100-200 особей.

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездится коло-

ниями, часто совместно с цаплями, колпицами, бакланами. Сравнительно небольшие гнезда устраивает на заломках тростника или на деревьях, обычно невысоко. Кладка в начале мая, состоит из 3-5 ярко-голубых яиц. Насиживание длится 21 день. Птенцы находятся в гнезде не более трех недель. Полет довольно быстрый, частые взмахи крыльев чередуются с планированием. Стая в полете выстраивается в ряд. Держатся обычно стайками. Кормится по илистым мелководным местам, разыскивая корм в илистом жидком грунте. Питается водными насекомыми и их личинками, моллюсками и другими беспозвоночными. Реже поедает рыбу [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходим контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006; 8. Гизатулин, Джамирозев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

АИСТ БЕЛЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Аист белый – *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.

Краткое описание. Очень крупные птицы типичного сложения. Ноги и массивный клюв ярко-красные. Все оперение тела белое. Маховые перья крыльев черные. Полет спокойный с глубокими взмахами крыльев, с частым и длительным парением. Взлет с земли тяжелый, с предварительным разбегом. От черного аиста отличается белой окраской [1].

Распространение. Западная Европа, Прибалтика, Белоруссия, Украина, Северо-Западная Африка [2].

Места обитания и численность. В прошлом, по данным М.Н. Богданова, «был весьма обыкновенен на Кавказе» [3]. В настоящее время в небольшом количестве встречается в период весенних и осенних миграций, предположительно гнездящийся вид [4]. Территориальное размещение приурочено к северу от Терского хребта. В гнездовой период, в июне 1990 года, пара птиц регистрировалась на разливах озер Степная жемчужина. При этом факт гнездования не был подтвержден [5]. Экспертная оценка современной численности на пролете – до 30-40 особей.

Особенности биологии. Населяет открытые и полуоткрытые пространства с отдельными деревьями или группами деревьев, с наличием водоемов в лесной и степной зонах, культурный ландшафт. Гнезда на крышах строений, столбах, деревьях. Кормовые биотопы – сырые луга, болота, мелководные участки медленно текущих рек, озер. Весенний пролет наблюдается во II декаде марта – апреле.

Гнезда крупные, используются много лет подряд. Поперечник их в толщине часто достигает полутора метров. В кладке от 2 до 6 яиц. Продолжительность их насиживания 33-34 дня. Птенцы покидают гнездо на 54-63-й день, а в возрасте 70 дней становятся самостоятельными. Питаются различными насекомыми, моллюсками, рыбой, амфибиями, рептилиями, грызунами и другой животной пищей [1].

Основные лимитирующие факторы. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты.

Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде. Занесен в список «Кодекса практических мер ... (Европы)» [2]. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [6, 7]. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходима эколого-просветительская работа среди местного населения и членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Точиев, 1990; 6. Гизатулин, 2006; 7. Гизатулин, Джамирзов, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



АИСТ ЧЕРНЫЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Аист черный – *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица. Клюв длинный, конический. Шея и ноги длинные. Пальцы относительно короткие. Крылья длинные и широкие, хорошо летает парящим полетом, во время полета, как журавль, держит шею вытянутой. Окраска оперения черная, с зеленоватым отливом, брюшко белое. Размах крыльев до 2 метров [1].

Распространение. Гнездится от Южной Швеции в Западной Европе, распространяясь через Малую Азию и Иран до Китая и Монголии. В России имеет широкое, но спорадическое распространение в лесной зоне и горных районах от западной границы до Магадана и Приморья. На Кавказе имеются обособленные участки - в лесах Краснодарского и Ставропольского краев, Чечне и Дагестане. Зимовки в Центральной и Южной Африке, Северной Индии и Южном Китае. [2,3]

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. М.Н. Богданов [4], посетивший регион в конце XIX века, черного аиста не встречал. В 50-х годах прошлого века И.Б. Волчанецким «не найден из числа возможных» [5]. Л.Б. Беме [6] в ландшафтах сопредельной территории Ингушетии отмечал его в числе редких, гнездящихся птиц. По последним наблюдениям, эта птица населяет пойменные леса равнинной и предгорной части региона, используя глухие, редко посещаемые чело-

веком места [7, 8, 9]. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет около 10-12 пар. Отмечено пять достоверных мест гнездования. Три гнезда в пойме р. Терек в Шелковском районе, одно гнездо в пойме р. Сунжи в зеленой зоне г. Грозного и одно в пойме р. Джалка в Гудермесском районе [10].

Особенности биологии. Преимущественно заселяет старые и перестойные лесные массивы, в их глухих и труднодоступных местах возле рек, лесных болот, стариц, озер. Весенний прилет с мест зимовок наблюдается в конце марта - начале апреля. Постройки гнезд из сухих ветвей располагаются на деревьях, обрывах и в нишах скал. С конца апреля в них откладывается от 4 до 7 (чаще 5) яиц. Насиживание яиц продолжается 30 дней, гнездовой период птенцов до 55-60 дней. Половая зрелость наступает на 3-5-й год. Питается в основном водными беспозвоночными, амфибиями и рыбой, реже мелкими грызунами, крупными насекомыми другими животными [1].

Основные лимитирующие факторы. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов.

Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Индией, Республикой Корея и КНДР, об охране мигрирующих птиц. В целях снижения фактора беспокойства на местах гнездования, необходима активная разъяснительная работа со школьниками, охотниками, туристами и другими любителями и пользователями природы. Охраняется в Аргунском и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков и др., 2004;

4. Богданов, 1879; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Беме, 1926; 7. Точиев, Гизатулин, 1988 б; 8. Гизатулин, Точиев, 1990; 9. Казаков и др., 1990; 10. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Казарка краснозобая – *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Заметно мельче домашнего гуся, клюв очень короткий, шея толстая. Масса до 1 кг. Верх головы и шеи, спина и брюхо черные, передняя сторона шеи и грудь каштаново-рыжие, подхвостье, полоса на боку и пятно у клюва белые. По характерной окраске легко отличима от остальных гусей и уток республики [1].



Распространение. Гнездится в тундре и в северной части лесотундры, Западной Сибири, на полуостровах Ямал, Гыдан и Таймыр. Основная часть особей зимует в низовьях Дуная, до 1968 года - южном Прикаспии, в небольшом количестве (отдельные особи и стайки) проникают в Месопотамию, в Северо-Западную Африку, в Европу, Иран и Юго-Восточный Китай [2].

Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид республики. В прошлом, по М.Н. Богданову [3], массовый осенний вид на Каспии, сопредельной территории Дагестана. В Центральном Предкавказье Л.Б. Беме [4] отмечал его в зимнее время. В Чеченской Республике встречаются небольшие стаи, чаще совместно с белолобыми гусями, в период миграций и теплые зимы [5]. Неоднократно отмечалась на озерах Степная жемчужина и Чебутла [6]. Ключевая территория в период миграций – Шелковской район. Экспертная оценка численности на пролете – до 200 особей.

Особенности биологии. Гнездится на возвышенных берегах рек и озер. В период линьки птицы, как правило, концентрируются в местах гнездования. Формирование пар происходит в местах зимовки. К размножению приступают в возрасте 3 лет. Основными объектами питания служат травянистые растения. На местах зимовок и во время пролета питается побегами злаков (в том числе озимыми) и подземными частями (луковицы, клубни, корневища) степных травянистых растений. Может использовать в пищу зерна, оставшиеся на полях пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. Мигрирует в смешанных стаях вместе с другими гусеобразными. Миграции совершаются как в дневное, так и в ночное время [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.

Меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложении 2 Бернской конвенции, Европейский Красный список. Охраняется в Степном, Парабочевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Запрет весенней охоты. Разъяснительная работа среди охотников о недопустимости добычи краснозобой



казарки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [7, 8, 9].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1926; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989. 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 8. Гизатулин, 2006а; 9. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ПСКУЛЬКА



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Окраска буровато-серая, на брюхе поперечные черные пятна, подхвостье белое. На лбу вокруг клюва белое пятно. Клюв и лапы красно-желтые. Очень похож на белолобого гуся, но заметно мельче, клюв относительно короче, белое пятно на лбу захватывает темя, вокруг глаз узкое желтое кольцо. Голос более высокий и писклявый, чем у белолобого гуся. Молодые птицы без белого пятна на лбу [1].

Распространение. Размножается в тундре и лесотундре северной Евразии. Гнездовой ареал состоит из 6 не связанных между собой фрагментов. Зимует в странах Восточного Средиземноморья, Малой Азии, в юго-восточном Прикаспии и в Китае. Различаются места зимовок и миграционные трассы разных популяций [2].

Места обитания и численность. Нерегулярно пролетный вид республики. В прошлом отмечался М.Н. Богдановым [3] на территории сопредельного Дагестана, во время осеннего пролета отмечался во множестве на Каспии. В настоящее время, как в Дагестане, так и в Чеченской Республике, наиболее редкий вид среди пролетных гусеобразных [4, 5]. Ключевая территория в период миграций – Шелковской район. Экспертная оценка современной численности на пролете не более 500 особей.

Особенности биологии. Населяет долины северных рек. Гнезда устраивает под прикрытием кустарников или кам-

ней. В кладке 4-6 яиц. В годы с неблагоприятными для гнездования условиями не размножается. Линяет в пределах гнездового ареала. На зимовках днем держатся на открытых побережьях водоемов. Питается листьями и побегами травянистых растений. Обычно мигрируют вместе со стаями белолобых гусей и краснозобых казарок. В совместных стаях с гусями и казарками часто кормятся на полях люцерны, озимой пшеницы и ячменя [1].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Внешнее сходство с белолобым гусем способствует случайной добыче во время охоты на гусеобразных. Беспokoйство в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.

Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в Степном, Парабачевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Необходима разъяснительная работа среди охотников о внешнем сходстве с белолобым гусем и недопустимости добычи пiskuльки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Бутьев и др., 1989; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ЛЕБЕДЬ МАЛЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Лебедь малый – *Cygnus bewickii* (Yarrell, 1830)


Категория и статус. V – восстанавливающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Больше гуся, но меньше лебедя-кликун. Окраска белая. Основание клюва желтое, конец черный. Граница черного и желтого цветов идет под прямым углом (у лебедя-кликун под острым углом) к плоскости клюва. У молодых птиц кончик клюва темный, но не черный. При плавании держит шею вертикально [1].

Распространение. Гнездится в материковых и островных тундрах Евразии. Выделяют западную и восточную популяции, распространенные соответственно западнее и восточнее низовьев реки Лена. Места зимовок птиц из западной популяции находятся на морских побережьях северо-западной Европы. Область зимовок этой популяции расширяется. Некоторые особи зимуют на берегах Каспийского моря. Птицы, гнездящиеся восточнее реки Лена, зимуют в Китае, Японии и Корее [2].

Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид республики. Современное территориальное размещение на пролете приурочено к водоемам поймы Терека и Сунжи. Ключевые территории – озера Степная жемчужина и Чебутла [3,4]. Экспертная оценка численности на пролете – не более 50 особей. Зимовки носят случайный характер [5]. В случае дальнейшего развития зимовок малого лебедя на Каспии и в сопредельных регионах в республике может произойти увеличение количества мигрирующих и зимующих особей.

Особенности биологии. В гнездовой период населяет заболоченные тундры с озерами. На зимовках держится на заболоченных низменностях и на открытых берегах внутренних водоемов. Моногам, к гнездованию приступает в возрасте 2-4 лет. Некоторые гнездовые постройки используются в течение ряда лет, возможно, несколькими поколениями птиц. Насиживают кладку в течение 30



суток самка и самец. В кладке 1-6 яиц. Период роста птенцов 45-60 суток. Максимальная продолжительность жизни в неволе до 36, в природе до 25 лет. Питается водной и наземной растительностью, иногда водными беспозвоночными (личинки и куколки ручейников, ракообразные) [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией, Японией и КНДР. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ОГАРЬ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Огарь – *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)

Категория и статус. III - редкий вид, распространенный на ограниченной территории.

Краткое описание. Несколько крупнее уток, на высоких ногах. Окраска ржаво-рыжая, голова охристо-белая, на шее тонкая черная полоска, крылья с белым зеркальцем и черными маховыми перьями. Самка мельче, голова желтоватая, полосы на шее нет. Характерная окраска позволяет отличить от всех остальных уток [1].

Распространение. Распространен в пустынно-степном поясе Палеарктики [2]. На Северном Кавказе – гнездящийся, пролетный, нерегулярно зимующий вид [3].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Современное территориальное размещение на гнездовании приурочено к полупустынным участкам к северу от Сунжи и Терека с временными и постоянными пресными и солоноватыми озерами. Ключевая территория – Терско-Кумская низменность. Изменений ареала вида в перспективе не предполагается. По несколько гнездящихся пар отмечается на разливах озер Степная жемчужина, Чебутла, у степных озер в районе ст. Старогладковской, водоемах урочища Киссык [4, 5]. В зависимости от наличия благоприятных факторов на местах гнездования, вид периодически исчезает и появляется вновь. В зимний период не регистрировался. Экспертная оценка гнездовой численности – до 80 пар.

Особенности биологии. Гнездится отдельными парами по открытым, слабо заросшим водоемам с твердыми берегами.

Наиболее ранняя весенняя встреча после зимнего перерыва в республике отмечена на разливах озера Степная жемчужина 20 марта 1983 г. Гнездо строит в глубокой норе, которую строит сама

птица, чаще использует брошенные норы лис, шакалов, барсуков или сурков. Кладка в начале апреля, состоит из 8-12 яиц кремового цвета. Гнездо из стеблей и листьев преимущественно злаков, выстилает пухом. Насиживает самка в течение 27-29 дней. Самец в это время находится рядом с гнездом. Кормится на воде, ныряет редко. Основу питания составляют водные беспозвоночные, их личинки, моллюски [2, 3].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Гизатулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ПЕГАНКА

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Пеганка – *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)


Категория и статус. III - редкий вид, распространенный на ограниченной территории.

Краткое описание. Крупнее домашней утки. Окраска контрастная. Голова, шея и пятно на брюшке черные, зоб, бока, брюшко и спина белые, грудь ржаво-рыжая, крылья черные с белым. Клюв красный, у самца с вздутием у лба, лапы розовые. Самка мельче, с белым ободком вокруг клюва. Молодые птицы белые с буровато-серым верхом. От всех уток отличается характерной окраской [1].

Распространение. Распространен в пустынно-степном поясе Палеарктики, проникая на Атлантическое побережье Европы [2]. На Северном Кавказе – гнездящийся, пролетный, нерегулярно зимующий вид [3].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Современное территориальное размещение на гнездовании в Чеченской Республике приурочено к полупустынным участкам к северу от Сунжи и Терека с временными и постоянными пресными и солоноватыми озерами. Ключевая территория в пределах Терско-Кумской низменности – степные озера: Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майорское, Генеральское, урочище Киссык [4,5]. В зимний период не регистрировался. Изменений ареала вида в перспективе не предполагается. В последние годы наблюдается небольшое увеличение и стабилизация численности. Экспертная оценка гнездовой численности до 120 пар.

Особенности биологии. Гнездится отдельными парами или небольшими сообществами, часто недалеко от берега. Гнездо устраивает в норах, которое вы-



капывает в мягком грунте, часто используя норы различных животных, заброшенные строения, естественные пещерки, изредка делает открытые гнезда. Выстилка гнезда из белого пуха. Кладки встречаются с первой декады мая и состоят из 7-10 кремовых яиц, часто в гнездо откладываются яйца несколько самок. Птенцы появляются в конце мая-начале июня. Птенцов водят оба родителя, собирая иногда несколько выводков. Кормится на воде, но не ныряет. Питается различными водными насекомыми, рачками, водорослями [2, 3].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [6,7,8].

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Гизатулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирозев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ЧИРОК МРАМОРНЫЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Чирок мраморный – *Anas angustirostris* (Menetries, 1832)


Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Мелкая утка, но заметно крупнее чирка-свистунка. Самец и самка окрашены одинаково, у самца небольшой хохолок. Окраска серая, с округлыми светлыми пятнами на спине и темным поперечным рисунком на зобу, от клюва через глаз удлиненное белое пятно, более темное у самца. Клюв относительно длинный, серый, у самки черный, лапы бурые. Своеобразная окраска позволяет легко отличить его от всех других уток [1].

Распространение. Населяет Средиземноморье, Азербайджан, Среднюю Азию, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию. До 60-х годов, возможно, гнезвился в северном и северо-западном Прикаспии. До 1984 года отмечались единичные встречи на крупных водоемах Предкавказья [2,3].

Места обитания и численность. В прошлом веке вид упоминался М.Н. Богдановым [4] один раз «в сентябре на Прорве», в дельте Терека. В пределах республики достоверно зарегистрированы две особи в 1983 году на Чебутлинских озерах в районе станции Каргалинской [5]. В настоящее время, видимо, на гнездовании вид исчез. Имеющиеся сведения позволяют предположить возможность встречи птиц на пролете и случайное гнездование на пойменных озерах Степная жемчужина, Чебутла и степных озерах урочища Киссык [6]. Экспертная оценка возможной численности не более 10 пар.

Особенности биологии. Обитатель пустынной и полупус-



тынной природных зон. Местами обычен, но в целом редок. В отличие от большинства речных уток гнездится непосредственно у воды, что связано с питанием преимущественно беспозвоночными, обитающими на мелководьях у уреза воды. Гнездо примитивно, строится на сухом месте, под прикрытием сухой травы или кустов, пуха в гнезде очень мало. Кладки встречаются с середины мая до конца июля, в кладке 7-12 белых, с палевым или буроватым оттенком, яиц. Больших стай не образует даже на пролете. Часто садится на свисающие над водой ветви деревьев [1,2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых и гнездопригодных территорий. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты и выпаса скота в водоохранных зонах степных озер. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах возможных гнездовий (озера Степная жемчужина, Чебутла, Майорское, Генеральское, урочище Киссык). Охраняется в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др., 2000; 4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ЧЕРНЕТЬ БЕЛОГЛАЗАЯ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae



Чернеть белоглазая – *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Голова, шея, грудь и бока рыже-коричневые, спина темно-бурая, подбородок, брюшко и подхвостье белые. «Зеркальце» белое. Клюв черный, лапы серые. Глаза светлые. Самка несколько светлее и бурее. От других нырковых уток отличается рыжевато-коричневой окраской и белым подхвостьем [1].

Распространение. Гнездится в Северной Африке, Средней и Южной Европе, Средней и Малой Азии. Северная граница ареала неустойчива. Ранее в России она проходила через верховья Дона, долину Средней Волги и предгорья Алтая. В настоящее время вид сохранился в низовьях Дона, в Предкавказье, на Нижнем Поволжье и на юге Западной Сибири. Зимует на побережьях Азовского, Черного, Каспийского, Средиземного морей; встречается во внутренних районах Малой Азии и в тропической Африке [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Современное гнездование приурочено к временным и постоянным водоемам, с наличием тростниково-камышевого пояса Терско-Кумской низменности и поймы Терека. М.Н. Богданов [3] находил ее здесь «очень обыкновенной». В настоящее время белоглазая чернеть находится также в относительно благополучном положении [4, 5, 6]. Ключевыми территориями



являются озера Степная жемчужина, Чебутла и урочище Киссык в Шелковском районе республики. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет до 250 пар.

Особенности биологии. Гнездиться предпочитает на водоемах с жесткой надводной растительностью (тростник, рогуз) с участками открытой водной поверхности пустынной и степной зоны. На мелководье обычно устраивает гнезда в зарослях тростника. Первые кладки встречаются во второй половине апреля. Массовое насиживание яиц отмечается в мае. Средняя величина кладки 9-10 яиц. Весной в местах гнездования после зимнего перерыва появляется в марте. Осенний пролет продолжается с середины августа до конца сентября. В пищу используются водные (ряска, рдест и др.) и наземные (солерос, лебеда) растения, а также водные беспозвоночные (личинки ручейников и хирономид) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, неустойчивый гидрологический режим водных угодий. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах гнездовий (озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык). Урочище Киссык и озеро Степная жемчужина выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8]. Охраняется в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, 2006; 8. Гизатулин, Джамирозев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

САВКА



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae


Савка – *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)

Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Среднего размера утка с короткими крыльями, длинным клиновидным хвостом. Окраска бурая, с мелким темным рисунком, голова белая, с черным теменем, шея черная, клюв ярко-голубой, ноги серые. Самка отличается темно-бурой головой с белыми полосами над глазом и у шеи, клюв и лапы серые. От всех уток отличается по форме и расположению хвоста и жестких заостренных перьев [1].

Распространение. Гнездится sporadически в западной части Средиземноморья, в Средней и Малой Азии, в Монголии, Северо-Западном Китае и Пакистане. В европейской части РФ размножается на водоемах Предкавказья и в Северном Прикаспии. Зимует на северном побережье Африки, в Малой Азии, в Месопотамии, в Пакистане и Индии, в России по Дагестанскому побережью Каспия [2,3,4,5].

Места обитания и численность. Возможно, гнездящийся, пролетный вид республики. В прошлом вид нередко встречался на гнездовании по солоноватым водоемам Ногайских степей и некоторым озерам поймы Терека [6, 7]. С 1960-х годов после резкого сокращения численности, вероятно, исчез на гнездовании. Разрушение ареала вида связано с изменением основных местобитаний, произошедших после усыхания и высыхания многих степных озер, и аридизацией в



нов, Северная Африка, Средний Восток, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Австралия. В России преимущественно в лесной зоне от западных границ до Камчатки, Сахалина и южных Курильских островов. В Предкавказье отдельные пары размножаются в пойменных лесах. Зимует в Восточной Африке и Южной Азии [2,3].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом весьма обычный хищник поймы Терека и его притоков [4]. В 1960-1970 годы еще регулярно отмечался в весенне-летнее время в поймах рек Терек, Сунжа, Хулхулау и Асса. Достоверная находка гнезда с двумя оперившимися птенцами относится к 13 августа 1967 года, в лесу поймы реки Джалка [5]. После резкого сокращения численности вида в 1980 годы, вероятно, исчез на гнездовании [6, 7]. В настоящее время достоверная гнездовая численность не установлена. Экспертная оценка условно-гнездовой численности не более 3

пар. Современное территориальное размещение на пролете приурочено ко всей предгорной зоне республики. Численность на миграциях – до 20 особей.

Особенности биологии. Населяет пойменные леса и древесные насаждения вдоль рек, озер, водохранилищ, реже морских побережий. Весной прилетает в конце марта-апреле. Массивные гнезда из древесных прутьев (средний диаметр около 1 м, высота 50–70 см) предпочитает устраивать на высокоствольных деревьях с уплощенной или обломанной, обычно отмершей вершиной. Охотно использует искусственные гнездовые платформы, может гнездиться на опорах ЛЭП и различных вышках в антропогенных местообитаниях. Моногам с гнездовым консерватизмом. Обычно занимает старые гнезда, ежегодно их подновляя. Кладка из 1-4 (чаще 2-3) яиц, продолжительность насиживания – более месяца. Летные молодые встречаются со второй половины августа. Отлет происходит в сентябре-октябре. Кормится рыбой средней величины (до 2-3 кг), добываемой с полета путем ныряния. Наиболее успешна охота на мелководьях с прозрачной водой [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Санитарные рубки старых сухостойных деревьев, беспокойство в период охоты, отстрел, сокращение рыбных запасов, загрязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Индией и Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты и вырубki высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Формально охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков, 1982; 4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000.

Составитель И.И. Гизатулин.

ЛУНЬ СТЕПНОЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Лунь степной – *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1771)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Среднего размера птица. Грудь и брюхо чисто белые, у крыльев темные только концы, надхвостье светлое, но не чисто-белое. В полете издали кажется белым и напоминает не-

сколько чайку. У самки верх темно-бурый, низ светло-охристый, с темными продольными пестринами, надхвостье белое, хвост в темных поперечных полосах. От полевого луня самец отличается более светлой окраской, отсутствием чисто-белого надхвостья и слабым развитием черного цвета на концах крыльев, от лугового – отсутствием поперечных полос на крыльях и рыжих пестрин на брюхе [1].

Распространение. Гнездовый ареал состоит из трех зон: оптимума (степи, лесостепи, полупустыни Евразии), спорадического распространения (юг лесной зоны в Европе и север пустынь Казахстана) и эпизодических гнездовых инвазий (Северная и Западная Европа) от Румынии и Украины до Алтая и юго-зап. Забайкалья и Джунгарии. Дальний мигрант. Зимует в Юго-Западной Азии и в Африке [2].

Места обитания и численность. Предположительно, гнездящийся, пролетный вид республики. В прошлом на территории республики и восточного Предкавказья в целом был обычным гнездящимся видом [3, 4, 5]. По данным Б.А. Казакова, на территории Терско-Кумской низменности гнездится предположительно [6]. В настоящее время гнездование вида в республике установить не удалось [7]. В небольшом числе регулярно отмечается в период весенних и осенних миграций [8]. Не исключается возможность гнездования в полупустынных степях к северу от Терека. Современное территориальное размещение во время миграций приурочено ко всей низменной зоне. Возможны встречи пролетных птиц и по магистральным ущельям в горах. Экспертная оценка численности в период миграций не более 30-40 особей.


Особенности биологии. Предпочитает разнотравно-злаковые, типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи с наличием мезофитных биотопов: луговых западин, заросших пойм ручьев, рек и озер. Может гнездиться на лесных полянах, окраинах лесов, в широких лесополосах и, вероятно, очень редко в агроценозах. На пролетах встречается в разнообразных условиях равнинных ландшафтов. Половой зрелости достигает в 3-4 года. В популяциях преобладают самцы в соотношении не менее чем 2:1. Весной птицы встречаются с начала апреля, кладки - в мае. Гнезда из сухой травы на земле в высокой траве, в кустарниках, в чахлах лесополосах. В кладке 3-5 (до 7) яиц. Продолжительность их насиживания около месяца. Количество яиц и выживаемость птенцов в значительной степени определяется кормовыми условиями. Птенцы начинают летать в возрасте 40-45 дней. С середины августа происходит отлет на зимовку, который продолжается до октября. Питается мышами, полевками, сусликами, жаворонками, трясогузками и другими птицами размером до чибиса и вороны, реже - рептилиями и насекомыми [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспokoйство в период охоты, отстрел.


Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС и 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Степном заказнике Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Казаков, 1982; 7. Гизатулин, Ильях, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.



ТЮВИК ЕВРОПЕЙСКИЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Тювик европейский – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Верх сизо- или буровато-серый, голова несколько темнее, с белой бровью, низ светлый, с узкими темными поперечными полосами. На беловатом горле резкая продольная буроватая полоска. Глаза красновато-бурые. Окраской и складом похож на тетеревятника, но значительно мельче (с голубя).

Распространение. Юго-Восточная Европа, Кавказ, Передняя и Малая Азия, Иран, Казахстан. В России распространен преимущественно в степной зоне – в бассейне Дона, Нижней и Средней Волги и Урала, к северу до Курска, Тамбова, Пензы, Самары, Уфы и южных районов Челябинской области, а также в предгорьях Северного Кавказа [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. По сведениям Л.Б.Беме [3], «был находим на территории Чечни и Дагестана в гнездовой период», считая этого ястреба немногочисленным, предположительно гнездящимся. Современное территориальное размещение приурочено к небольшим дельтовым лесам Терека и Сунжи и мозаичным лесным массивам предгорной зоны. Достоверно зарегистрирован в пойменном лесу р. Джалка Гудермесского района. Экспертная оценка гнездовой численности в республике – около 10-15 пар [4,5]. Численность на миграциях не выяснена.

Особенности биологии. Населяет преимущественно пойменные леса. Изредка наблюдается в искусственных лесонасаждениях (искусственных древесных массивах, лесополосах, лесопарках, парках). Половая зрелость наступает менее чем через год. Весной прилетают в конце апреля - начале мая. Рыхлые гнезда на деревьях строят сами или занимают чужие, которые перестраивают. Кладки с 3-4 яйцами с середины мая. Их насиживание продолжается около месяца. Выкармливание птенцов длится около месяца, и во второй половине июля молодые птицы покидают гнезда. Миграции на зимовки в сентябре. Охотится в основном на открытых участках, берет добычу с земли и сравнительно редко преследует птиц в угон на лету. Питается ящерицами, мелкими млекопитающими, насекомыми, реже птицами [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Приложение СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

КУРГАННИК

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Курганник – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Верх светло-бурый с рыжим оттенком, низ охристый или рыжеватый, часто с пестринами, маховые перья, за исключением концов, беловатые. На сгибах крыла хорошо заметны темные пятна, хвост в поперечных полосах, но издали кажется одноцветным. Размах крыльев до 1,5 метра. Похож на канюка, но несколько крупнее и обычно светлее [1].



Распространение. Юго-Восточная Европа, Сев. Африка, Закавказье, Казахстан, Передняя и Средняя Азия – на восток до Синьцзяня и Монголии, к югу до северо-западного Пакистана. В России – Предкавказье, Нижнее Поволжье, Южное Приуралье. В ряде западных районов исчез или обитает очень редко. Зимует в Средней Азии, Северной Индии, Северо-Западной Африке [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом М.Н.Богданову [3], обследовавшему Терскую область, курганник не встречался. Л.Б.Беме [4] и И.Б.Волчанецкий [5] отмечали его на гнездовании в ландшафтах сопредельного Дагестана. В настоящее время гнездящийся вид республики [6,7,8]. Территориальное размещение приурочено к пойменным лесам, рощам и тугаям в пределах Терско-Кумской низменности. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет до 20-30 пар. На пролете регистрируется по всей предгорной и по магистральным ущельям горной зоны. Численность на миграциях – до 150 особей.

Особенности биологии. Характерный степной вид, обитающий в степях, полупустынях и пустынях. Прилетает в марте – первой половине апреля, уже во второй половине апреля можно встретить кладки. Крупные гнезда строит на кустарниках, одиночных деревьях, краях лесополос, на обрывах, буграх, старых скирдах, редко на земле, опорах линий электропередач. В кладке 2-5 яиц (чаще 3-4). Продолжительность насиживания яиц около 35 дней. При гибели первой кладки птицы могут нести вторую, что влияет на сроки размножения. Развитие птенцов в гнезде – 1,5 месяца. Вылет их происходит обычно в конце июня-июле. Осенние миграции в сентябре-октябре. Основным кормом являются песчанки, суслики, полевки и другие грызуны [2]. В Чеченской Республике гнездо курганника найдено 2 мая 1989 года в тополиной роще на окраине озера Степная жемчужина Шелковского района. При этом кладка яиц отсутствовала. При последующем посещении гнезда 20 мая в лотке находилось 2 яйца [9,10].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное антропогенное освоение степей (распашка земель), разорение хорошо заметных гнезд. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на ключевых местах гнездовий (урочище Киссык). Охраняется в



Степном заказнике Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Точиев, Гизатулин, 1987; 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 8. Анисимов, 1989; 9. Гизатулин, Ильях, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ЗМЕЕЯД



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Змееяд – *Circus gallicus* (Gmelin, 1788)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица с относительно длинными крыльями и большой головой. Верх темный, серовато-бурый, низ почти белый, с изменчивым черным рисунком, горло и зоб обычно темные. Концы маховых перьев черные. На длинном хвосте 3-4 нерезких темных полосы. Глаза желтые и очень большие. Перо рыхлое, пушистое. Размах крыльев до 1,8 метра [1].

Распространение. Южная и Средняя Европа, юго-западная Сибирь, Средняя Азия, северная Монголия, к югу до передней Индии; Африка. В России основная часть ареала занимает смешанные леса и лесостепь европейской части. В азиатской части, возможно, гнездится местами вдоль границы с Казахстаном. Зимует в африканских саваннах к югу от Сахары [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Населяет всю равнинную часть, но везде немногочислен, как в прошлом [3,4], так и в настоящее время [5,6]. Экспертная оценка гнездовой численности составляет 5-10 пар. На пролете регистрируется по всей предгорной и по магистральным ущельям горной зоны [7,8]. Численность на миграциях – до 80 особей.

Особенности биологии. Населяет сухие леса по соседству с обширными открытыми территориями с высокой численностью пресмыкающихся. Весной прилетает в конце

марта - апреле. Гнезда делает на вершинах деревьев (дуба, липы, сосны и др.) обычно недалеко от опушек, реже в глубине леса. Кладка с 1 яйцом наблюдается в конце апреля – начале мая. Насиживание продолжается более месяца, гнездовый период – около 10 недель, птенец вылетает из гнезда в августе. На юг отлетают в сентябре – начале октября. Под Кизляром Л.Б. Беме [3] прилет змееядов наблюдал в начале апреля, а отлет – в начале сентября. Питаются гадюками, полозами, ужами, изредка ящерицами и очень редко лягушками, грызунами, птицами [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное сельскохозяйственное использование доступных земель отрицательно повлияли на кормовые ресурсы вида (численность змей и ящериц). Беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди местного населения и членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Степном, Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках рес-

публики, зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильяхов, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ОРЕЛ СТЕПНОЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Орел степной – *Aquila rapax* (Temminck, 1828)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.


Краткое описание. Крупный, довольно темный орел. Окраска однотонно бурая, на затылке иногда ржавое пятно. Молодые птицы светло-бурые, с пестринами и пятнами, маховые перья заметно темнее оперения тела. Когти относительно слабые. Размах крыльев до 2 метров [1].

Распространение. Юго-Восточная Европа, юго-западная Сибирь, Передняя и Средняя Азия от Туркестана до северо-западного Китая, Индия, Аравия, Африка. В России – восточное Предкавказье, Нижнее Поволжье и южное Предуралье, предгорья Алтая и Саян, степи Забайкалья. Зимует в Африке, на Аравийском полуострове, в Индии [2]. Единичные особи отмечались на зимовках в Калмыкии [3] и предгорьях Дагестана [4].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [5] в Чеченской Республике этого орла не находил, но был убежден, что он гнездится. До 60-х годов прошлого века на равнинах в восточного Предкавказья степной орел был весьма обычен [6, 7, 8]. В настоящее время населяет полупустынные степи к северу от Терека, а также остепненные склоны Терского и Сунженского хребтов [9, 10, 11, 12, 13]. Гнездовая численность не высока и, по экспертной оценке, составляет до 10 пар. Общая численность на миграциях – 150-200 особей. В связи с относительным улучшением в последнее десятилетие экологической обстановки

на юге России для орлов (сокращение посевных площадей, падение поголовья скота, минимизация количества используемых пестицидов в сельском хозяйстве и т.д.), с учетом необходимых природоохранных мероприятий, возможно увеличение плотности населения.

Особенности биологии. Живет исключительно на открытых пространствах степей и полупустынь со значительными нераспаханными территориями, достатком корма (преимущественно сусликов), низкой численностью населения [2]. Весной появляется в конце марта – апреле. В Чеченской Республике наиболее ранняя встреча после зимнего перерыва четырех особей отмечена 19 марта 1983 года в бурунной степи Шелковского района [9]. Массивные гнезда устраивает на земле на склонах холмов, курганов, балок, на стогах сена, кустах, иногда на опорах ЛЭП. Строят они из крупных сухих веток, стеблей травы, костей и выстилают различной ветошью, шерстью, перьями, конским волосом, сухим пометом животных. Кладки из 1-3 яиц (чаще 2) появляются уже во второй половине апреля. Выкармливание птенцов длится около 60 дней. Молодые птицы



вылетают из гнезда в июле – начале августа. В окрестностях Кизляра (Дагестан) Л.Б. Беме [6] кладки с 1-3 яйцами находил в мае. По его же сведениям [7], «на рынке в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) казаки часто продавали в июле-августе молодых степных орлов, вынутых из гнезда в окрестностях станиц Слепцовская, Карабулакская и др.» В конце августа – начале октября птицы покидают районы размножения.

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов, сокращение основных кормовых ресурсов (суслики, тушканчики, песчанки и другие грызуны), разорение гнезд [12], беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимо придание статуса ООПТ ключевым местам гнездования. Охраняется в Степном заказнике Чеченской Республики. Установка птицевежных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди местного населения и членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Самородов, 1981; 4. Равкин и др., 1990; 5. Богданов, 1879; 6. Беме, 1925; 7. Беме, 1926; 8. Варшавский и др., 1989; 9. Гизатулин, Ильях, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001; 11. Точиев, Гизатулин, 1987; 12. Точиев, Гизатулин, 1988 в; 13. Анисимов, 1989.

Составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae


Подорлик большой – *Aquila clanga* (Pallas, 1811)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный, очень темный орел. Оперение головы и тела однотонное, черно-бурое. На надхвостье иногда беловатое пятно. У молодых верх со светлыми, каплевидными крапинками. От степного орла, могильника и беркута отличается однородной, очень темной окраской и несколько меньшими размерами. От малого подорлика в полевых условиях практически не отличим (несколько крупнее и темнее) [1].

Распространение. Средняя полоса Евразии от Прибалтики, Венгрии, Югославии до северо-восточного Китая и Японского моря. Зимует в юго-восточном Закавказье, Египте, Иране, Месопотамии, Индии, Бирме [2].

Места обитания и численность. Пролетный вид республики. В прошлом, по сведениям М.Н. Богданова [3], большой подорлик «в степях вдоль Терека, начиная от Чир-Юрта попадался ежедневно». В настоящее время в Чеченской Республике и восточном Предкавказье в целом встречается исключительно во время весеннего и осеннего пролета [3, 5, 6]. Современное территориальное размещение в период миграций приурочено широким фронтом ко всей предгорной зоне и магистральным ущельям крупных рек. На осенних миграциях наблюдается групповой пролет численностью до нескольких особей. Весенний пролет выражен слабо, преиму-



шественно одиночными птицами. Экспертная численность на миграциях – до 100-150 особей.

Особенности биологии. На гнездовании приурочен преимущественно к высокоствольным, но не слишком густым, часто заболоченным лесам. Проникает в лесостепь и изредка в леса на севере степной зоны. Моногам, половая зрелость наступает на 3-4-м году жизни. Весной появляется в конце марта - апреле. Гнездовые участки занимает помногу лет. Гнезда в развилках стволов деревьев высоко над землей. В кладке 2 яйца, но в результате каннибализма птенцов на крыло поднимается только одна молодая птица. На зимовку с мест гнездовой отлетают в сентябре. Кормом служат мышевидные грызуны, зайцы, реже амфибии, ужи и другие животные. Охотится с полета, из засады или догоняя пешком добычу на земле [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходима установка птицевоздушных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Гизатулин, Ильяхов, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Казаков, 1982;

Составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК МАЛЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae


Подорлик малый – *Aquila pomarina* (C.L. Brehm, 1831)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Окраска серо-бурая, голова серая. У молодых птиц на верхней стороне тела охристые пятна, образующие полосы на крыльях, затылок охристый. Похож на большого подорлика, но мельче и светлее [1].

Распространение. Ареал разьединенный: средняя Европа от Восточной Германии и Австрии до средней России, Балканы, Малая Азия, Кавказ и север Ирана, с одной стороны; с другой – Индия, кроме Синда, северная Бирма. В России гнездовой ареал состоит из двух изолированных участков. Первый охватывает леса от западных границ до Санкт-Петербурга, Московской обл., Тульских Засек; второй – поймы и равнины Предкавказья, Кавказ [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] находил его обычным по долинам рек Кавказа. Л.Б.Беме встречал его в миграционный период в сопредельной Ингушетии, но, по словам Н. Селегененко, он гнезился в лесах предгорий [4]. По данным И.Б. Волчанецкого малый подорлик обычен в низовьях Терека [5]. Н.А. Рашкевич [6] отмечал этого подорлика в республике обычным, но характер распространения не уточнил. Современное территориальное размещение приурочено к лесным ландшафтам всех типов предгорной части региона. Малочисленный



вид. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 7-10 пар [7, 8]. Численность на миграциях – до 50 особей. Мигрирует широким фронтом, преодолевая горную часть по магистральным ущельям крупных рек.

Особенности биологии. Размножается в сырых лиственных и смешанных старых крупноствольных лесах, чередующихся с лугами, болотами, пустошами, сельхозугодьями. В Предкавказье обитает в пойменных широколиственных лесах. Моногам. Весной прилетает в апреле. Гнезда устраивает на лиственных, реже на хвойных деревьях. Пользуется ими нескольких лет. Обычно они располагаются у опушки, высоко от земли. Кладки во второй половине апреля – мае. В гнезде 2 яйца, но в результате каннибализма птенцов вылетает лишь один. Гнездовый период продолжается около 8 недель. В период размножения встречаются кочующие холостые особи. Осенний отлет наблюдается в сентябре. Кормятся мышевидными грызунами, пресмыкающимися, лягушками, насекомыми. В их гнездах отмечаются также цыплята, молодые дрозды, жаворонки, ежи, зайчата и другие животные [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство на местах гнездовой и в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.

Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицевоздушных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском, Парабочевском заказниках и в зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1926; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Рашкевич, 1980; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

МОГИЛЬНИК



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Могильник – *Aquila heliaca* (Savigny, 1809)


Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный, ширококрылый, несколько короткохвостый орел. Окраска бурая, иногда почти черная. Верх головы светло-желтый (пятном), на плечах часто белые пятна. Молодые светло-бурые с продольными пестринами по низу. Перья на конце крыла расставлены пальцеобразно. Размах крыльев до 1,9 м [1].

Распространение. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Населяет южные окраины лесной зоны, лесостепь, степи, полупустыни, пустыни, изредка встре-

чается в горах. В первой половине XX в. был распространен в Южной Европе, от Пиренеев до Балкан, в Северо-Западной Африке, в южной полосе европейской части СССР, на юге Сибири до Забайкалья, в Крыму, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, на северо-западе Пакистана, в Северной Монголии. В XX в. в ряде районов исчез, и в последние десятилетия большая часть ареала состоит из изолированных участков. В России спорадично размножается в европейской части и на юге Сибири. В Европе самые северные гнездовья на Урале, в Азии от Алтая до Прибайкалья. На прилегающих к России территориях спорадично гнездится по всей Украине, в Закавказье, Казахстане, Китае и Монголии. Зимует на Среднем Востоке, в северо-восточной Африке и юге Аравийского полуострова [2].

Места обитания и численность. В прежние времена могильник в республике был относительно обычен и отмечался на гнездовье в равнинной части до предгорий включительно [3, 4]. В настоящее время в гнездовой период территориальное размещение в пределах Терских и Сунженских пойменных лесов в Наурском, Шелковском, Сунженском и Гудермесском районах [5, 6]. В горной части на гнездовании могильник не встречается [7, 8]. С середины прошлого века популяция могильника претерпела в республике отрицательную динамику, что привело к ее значительной деградации. По экспертной оценке, общая численность составляет не более 5-10 гнездящихся пар [9]. В период весеннего и осеннего пролета встречается по всей предгорной зоне. Современная численность на миграциях 60-80 особей.



Особенности биологии. Характерные гнездовые биотопы – сухие боры с высокоствольными соснами, окруженные открытыми территориями, облесенные балки, островные леса из дуба, тополя и других деревьев. Обязательное условие обитания – обилие запаса корма: поселений сусликов, песчанок или других грызунов. Половозрелые с 3-4 лет. Весной прилетают в конце марта – апреле. Летят парами, одиночками, небольшими группами. Гнезда устраивают обычно на вершинах высоких деревьев, реже в безлесных районах, селятся в балках на низкорослых деревьях, группах деревьев в степи, на опорах ЛЭП. Одно и то же гнездо используется много лет подряд, причем у пары орлов есть обычно 2-3 гнезда, которые птицы занимают посменно. Размножение позднее, в кладке 2-3 яйца. Насиживание яиц продолжается около 1,5 месяца, выкармливание птенцов – 2 месяца. Вылетают молодые в июле-августе. Отлет на зимовку обычно в сентябре-ноябре. Кормом служат суслики, хомяки, сурки, ежи, зайцы, грачи, голуби, куропатки и другие животные. Имеется некоторое соответствие между численностью сусликов и распространением могильников. Охотно поедают падаль [2]. Гнездо могильника, найденное 8 апреля 1984 г. на краю пойменного леса р. Терек, в двух километрах южнее станицы Старогладковской, располагалось на верхушке черного тополя на высоте 8-9 м. Судя по тому, что птицы занимались ремонтом постройки, гнездились они здесь неоднократно. В стенке гнезда из сухих сучьев деревьев и кустарников виднелись старые тряпки. По краю лотка были уложены свежие ветви тополя с зеленой листвой. 9 июля в гнезде находилось два пуховых птенца, которые 2 июля почти полностью оперились. Анализ погадок показал наличие в основе их питания гребенщиковой песчанки и в небольшом числе домашних кур [9].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Наиболее значимые факторы – сокращение лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и подрыв кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами, беспокойство на местах гнездовий и в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты и вырубki высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицевеgetационных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском, Парабочевском заказниках республики и в зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1926; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильяхов, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001; 9. Точиев, Гизатулин, 1988.

Составитель И.И. Гизатулин.

БЕРКУТ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Беркут – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный орел с узкими крыльями и длинным хвостом. Окраска черно-бурая, низ светлее, на затылке и задней стороне шеи заостренные золотисто-желтоватые перья. У молодых птиц хвост светлый, с широкой темной полосой по краю, у старых – с беловатым основанием хвоста. Размах крыльев около двух метров [1].

Распространение. Северная Евразия, Северная Америка и Северо-Западная Африка. В России гнездовой ареал дисперсно охватывает три четверти территории страны и включает всю лесную зону (без Приамурья) и лесотундру, северные склоны Кавказа и крайний юг Приморья. Часть птиц проводит зиму в пределах гнездового ареала, часть откочевывает к югу [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] в гнездовой период беркута на Кавказе не встречал. По сведениям Л.Б. Беме [4], в горах он обычен. Н.А. Рашкевич [5] и П.С. Анисимов [6] приводят его как малочисленную, редкую высокогорную птицу республики. Современное территориальное гнездовое размещение приурочено ко всей горной части от Лесистого до Бокового хребта. Экспертная оценка численности составляет до 20-30 пар [7, 8]. Общая численность на миграциях и кочевках 60-80 птиц. В зимнее время отдельные особи встречаются в равнинной зоне. Вид находится в относительно благополучном положении, поскольку населяет территории,

в меньшей степени подверженные антропогенному воздействию. Возможность расселения и заселения видом предгорной зоны не предполагается.

Особенности биологии. Живут в труднодоступных лесах, предпочитая лесные массивы среди болот, а также в горах. Обязательно соседство гнездового участка с обширными болотами, речными долинами, пустошами, пастбищами, где хищникам удобно охотиться. К размножению приступают в 3-5 лет. Гнезда строят на крупных деревьях, обрывах, скалах. Кладка из 1-3 яиц, насиживание 42-45 дней, птенцы кормятся свыше 2 месяцев. Зимой в поисках корма широко кочуют. Основная добыча – зайцы, сурки, гуси, утки, цапли, журавли, куриные и другие животные; зимой кормятся также павшими животными [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокорство в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.

Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицевозащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1926; 5. Рашкевич, 1980; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильях, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный орлан с коротким, слегка клиновидным хвостом. Размах крыльев до 2,5 м. Окраска бурая, голова и нижняя сторона тела светлее, хвост чисто-белый, клюв желтый. Молодые птицы темно-бурые, низ с продолговатыми пятнами, хвост и клюв темные [1].

Распространение. Весь север Евразии: от Скандинавии, Дании, Венгрии, Балкан, Греции на западе до Камчатки, океанского побережья Восточной Азии, Китая, Кореи на востоке; Малая Азия, Ирак, Иран, Монголия [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики. М.Н. Богданов [3] в гнездовое время часто встречал его на Тереке. В начале прошлого века этот вид был обычен на гнездовании в пойменных лесах Терека, а зимой это был самый многочисленный хищник региона [4, 5, 6]. В настоящее время численность сократилась до критического уровня. За все время наблюдений выявлена одна гнездовая пара 5-7 апреля 1984 г. в пойменном лесу в Шелковском районе. В зимнее время орлан-белохвост весьма обычен [7, 8, 9]. Экспертная оценка гнездовой численности – до 3 пар, на зимовке и кочевках – до 20 особей.



Особенности биологии. Размножается в пойменных лесах, на металлических опорах ЛЭП. Территориально оседлые птицы. Пары, сохраняющиеся в течение всей жизни (не менее 20 лет), имеют постоянные гнездовые и охотничьи территории. Гнезда строят в развилках деревьев и используют их обычно в течение многих лет. Кладки с 1–3 (чаще 2) яйцами появляются с марта–апреля. Насиживание их продолжается около месяца. Птенцы выкармливаются около 2,5 месяца и покидают гнезда в июне-июле. С конца октября–ноября к местным птицам присоединяются орланы, прилетающие из более северных районов ареала. Птицы полифаги и пластичны в отношении корма. Их добычей служат различные виды рыб, а также звери и птицы. Весной и осенью значительное место в рационе занимают пролетные пернатые. Охотно поедают падаль (особенно в холодное время года) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов. Беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Сокращение рыбных запасов, загрязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана недостаточна.


Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты и вырубki высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Установка птицевозащитных устройств на опорах ЛЭП. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г.Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1926; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Точиев, Гизатулин, 1988д; 8. Гизатулин, Ильях, 2000; 9. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.



БОРОДАЧ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Бородач – *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Очень крупный орел с длинными, сравнительно узкими крыльями и длинным заметно клиновидным хвостом. Голова и шея в отличие от грифов полностью оперены, восковица прикрыта щетинками, под клювом своеобразная «борода» из жестких щетинистых перьев, цевка оперена до пальцев. Спина сизая или черная, низ светлый, беловатый, с охристым налетом. Голова белая, с широкой черной полосой через глаз [1].

Распространение. Большой Кавказ, центральный и юго-восточный Алтай. В пределах России проходит северная граница распространения бородача. Вне России обитает в области Средиземноморья, Южной и Восточной Африки, в Малой Азии, Иране, Ираке, Афганистане, Средней Азии, Гималаях [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, территориально оседлый вид республики. В прошлом, по сведениям М.Н. Богданова [3], бородач был редкой птицей Кавказа. П.С. Анисимов предполагал, что в ЧИАССР обитает не более 2-3 пар [4]. По нашим наблюдениям, бородач населяет ущелья Скалистого и Бокового хребтов всей горной зоны. Сравнительно обычен, и численность стабильна. По экспертной оценке, гнездится не менее 10-15 пар [5, 6]. Находится в относительно благополучном положении, так как основные гнездовые местообитания подвержены антропо-

генному прессу в меньшей степени. Изменения ареала в республике маловероятны.

Особенности биологии. Обитатель скалистых высокогорий. Гнездится среди скал, выбирая для гнезда недоступные выемки или ниши в отвесных обрывах. Кладка в конце февраля – марте, состоит из 1-2 охристых, часто с буроватыми пятнами, яиц. Добычу высматривает, облетая на планирующем полете на небольшой высоте горные склоны или описывая круги высоко в воздухе. Очень осторожен. Голос похож на свист. Питается останками погибших животных, используя как свежие трупы, так и кости, высохшие обрывки шкур и сухожилия. Иногда нападает на живую добычу (некрупных млекопитающих, птиц, черепах) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Сокращение кормовой базы в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Вид внесен в Приложения 2 СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильях, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

СТЕРВЯТНИК

Тип Хордовые – *Chordata*

Класс Птицы – *Aves*

Отряд Соколообразные – *Falconiformes*

Семейство Ястребиные – *Accipitridae*

Стервятник – *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на периферии ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими крыльями и длинным сравнительно узким клиновидным хвостом. Клюв длинный и слабоизогнутый, когти тупые, кожа на лицевых частях головы оранжево-желтая, лишена перьев, на затылке и шее «воротник» из заостренных перьев. Взрослые птицы чисто-белые, с черными маховыми перьями, молодые – бурые, с рыжеватыми пестринами на шее и спине [1].

Распространение. Низкогорные и среднегорные районы Большого Кавказа. Вне России распространен в Африке, центральных и южных районах Евразии [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный вид, населяющий юго-восточную часть Чеченской Республики в зоне Скалистого и Пастбищного хребтов. М.Н. Богданов сообщает о встречах его в прошлом, в степях по Тереку [3]. Нами в равнинной зоне региона стервятник ни разу не был отмечен. В гнездовой период наблюдался 15 сентября 1990 г. в окрестностях озера Кезеной-Ам в пределах Андийского хребта. Очень редкая птица. Экспертная оценка гнездовой численности – 2-3 пары [4, 5].


Особенности биологии. Населяет невысокие горы и опустыненные предгорья часто вблизи пастбищ и человеческих поселений. Перелетная птица. Гнездится отдельными парами, часто в колониях сипов, в нишах и небольших пещерах скалистых эскарпов. Гнездо выстлано обрывками шкур, клоками шерсти и т.п. Кладка в конце апреля – мае, состоит из 2 охристых, густо покрытых ржавчато-бурыми пятнами яиц. Добычу высматривает либо высоко паря, либо сидя на скалах. В местах, где много пищи, образует стаи. Питается падалью и различными отбросами, пресмыкающимися (черепахами, ящерицами) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веденском заказнике Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Гизатулин, Ильяхов, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.



ГРИФ ЧЕРНЫЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Гриф черный – *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Очень крупная птица с широкими длинными, размахом свыше 2 метров, крыльями. Голова покрыта белым пухом, шея обычно голая, с голубоватой кожей. Вокруг основания шеи «воротник» из рассученных бледно-голубых перьев. Ноздри округлые. Восковица надклювья голубоватая. Окраска оперения темно-бурая, маховые черные. Молодые птицы темнее, черноватые [1].

Распространение. Населяет северные склоны Большого Кавказа. Вне России обитает в Северной Африке, Южной Европе, горных системах Азии [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики, редкий как в прежние [3], так и в настоящее время. В 60-е годы прошлого века общая численность составляла до 10 пар [4]. В гнездовой период населяет Веденский и Ножай-Юртовский районы, сопредельные с Дагестаном. В период кормовых миграций возможны встречи по всей республике, от равнин до высокогорий. Современная гнездовая численность не превышает 5-6 пар [5,6].

Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет горные лесистые районы с обширными открытыми пространствами. Часть особей совершает кочевки на очень большие расстояния, встречаясь на равнинах Предкавказья. Гнезда устраивают на деревьях, реже на скалах. Гнездование одиночное или разреженными колониями. Цикл размножения

около 6 месяцев. Брачное поведение отмечается со второй декады февраля. Единственное яйцо откладывается, как правило, в начале марта. Птенец покидает гнездо во второй половине июля. Основу рациона составляет падаль крупных животных [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокорство в период охоты, браконьерский отстрел для изготовления чучел.

Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц, Список видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в горных и равнинных заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильях, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

СИП БЕЛОГОЛОВЫЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Сип белоголовый – *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими крыльями и коротким округлым хвостом. Окраска серая, верх буровато-палевый, низ рыжеватый, маховые и хвост черные. Из густого белого пуха «воротник» (у молодых птиц из рассученных буроватых перьев). Надхвостье палевое, со светлыми пятнами. Молодые окрашены темнее [1].

Распространение. В России проходит северная граница ареала. На гнездовании вид известен по северным склонам Большого Кавказа. Вне России населяет горы Южной Европы, Северной Африки, Средней Азии, Казахстана. Совершая кочевки в поисках пищи, встречается на значительном удалении от мест гнездования [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики. М.Н. Богданов [3] находил его обычным в гнездовой период, как в горной зоне, так и на равнинах Терско-Кумской низменности. До настоящего времени численность белоголового сипа отрицательных изменений не претерпела. Населяет ущелья Скалистого хребта и его отрогов, по всей горной зоне республики. Здесь нередко отмечаются одиночки и стаи 3-8 особей. На кочевках встречается по всей республике, преимущественно в местах выпаса скота. Гнездовая экспертная численность составляет 15-20 пар. [4,5,6].

Особенности биологии. Оседлый вид. Населяет горы и предгорья, в поисках пищи нередко встречается на равнине. Гнездится колониально по 5-10 и более пар. Гнездовые поселения, как правило, постоянные, устраивает на скальных обнажениях солнечных экспозиций с нишами, пещерами и карнизами. На падали нередки скопления до 30 и более птиц. Гнездование со второй декады февраля. Цикл размножения около 6 месяцев. В гнезде, как правило, бывает один птенец, вылетающий во второй половине июля. Питается падалью, предпочитая внутренности крупных животных. [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты. Незаконный отстрел сипов в таксидермических целях.


Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веденском заказнике Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин, Ильях, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.



БАЛОБАН



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Балобан – *Falco cherrug* (Gray, 1834)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный (крупнее вороны) сокол с относительно широкими крыльями. Окраска рыжевато-бурая. Низ светлый, почти белый, с каплевидными пестринами, у молодых пестрины продольные. По бокам головы нередко выражены «усы». Лапы желтые [1].

Распространение. В России населяет лесостепь, юг лесной зоны, островные леса в степях, предгорья и склоны гор на юге страны. Гнездовый ареал простирается от Венгрии до Забайкалья. Обитает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, в Казахстане, Монголии и Китае. В Европе ареал крайне пятнистый или даже точечный. Равнинные популяции зимуют в Средиземноморье, на Среднем Востоке, в Индии и Китае [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики [3]. В конце IX – начале XX века балабан был обычным видом долины Терека [4, 5, 6, 7]. Современные достоверные встречи в гнездовой период отмечены в районе Терека по линии станций Червленая – Старогладковская [8]. Гнездовой ареал приурочен к пойменным лесам Терека и Сунжи. Достоверная гнездовая численность неизвестна. Экспертная оценка численности может составлять не более 10 пар.

Особенности биологии. Гнездится на опушках лесов, вблизи открытых мест, что позволяет охотиться на сусликов и

другую добычу. Иногда селится в колониях цапель и грачей, на опорах ЛЭП. Занимает гнезда врановых и других птиц, сам строит их сравнительно редко. Места гнездования весьма постоянны и занимаются из года в год. Весной появляются в марте-апреле. В кладке 3-5 яиц, насиживание около месяца. Птенцы в гнезде 35-45 дней, вылетают в июне-июле, но еще около месяца они живут на гнездовом участке, подкармливаемые родителями. Осенние миграции в октябре, отдельные птицы в некоторые годы могут зимовать. Добыча балабана – суслики, полевки, массовые виды птиц (голуби, грачи, скворцы, жаворонки и др.) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых станций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов и сокращением лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и подрыв кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами. Беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна.

Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС и 2 Боннской конвенции.

Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицевоздушных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Беме, 1935; 7. Беме, 1950; 8. Гизатулин, Ильях, 2000.

Составитель И.И. Гизатулин.

САПСАН

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Сапсан – *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный (крупнее голубя) сокол, крылья острые, хвост слегка клиновидный. Окраска контрастная. Верх головы, спина, крылья и хвост темные, низ светлый, с тонким поперечным рисунком на боках и подхвостье. На груди каплевидные пестрины. Под глазами темные пятна – «усы». Лапы желтые. Молодые бледнее, низ тела в широких продольных пестринах [1].

Распространение. Населяет все континенты, кроме Антарктиды. Ареал охватывает всю территорию России - от западных границ до Чукотского полуострова, Камчатки и Курильских островов и от зоны тундры до южных границ страны; избегает сухих степей и пустынь [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики [3]. Как в прежнее [4], так и в настоящее время сапсан немногочислен. Гнездовые станции его приурочены ландшафтам Скалистого и Пастбищного хребтов. На миграциях и зимовке встречается по всей низменной зоне республики. В это время встречается четыре подвида сапсана, включая особей из других областей России [5]. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 20 пар [6]. Существование вида относительно благополучно, и в ближайшей перспективе изменения маловероятны.


Особенности биологии. Гнездится в перемежающихся с открытыми пространствами лесах (на деревьях), на скалах, утесах, речных обрывах. Не избегает соседства с человеком и может гнездиться на крупных зданиях в городах, на старых башнях, колокольнях, развалинах. Кладки из 2-4 яиц. Насиживание продолжается 20-32 дня. Период оперения птенцов - 35-42 дня. Молодые самостоятельными становятся в течение последующих двух месяцев. Продолжительность жизни в природе до 15 лет. Питаются почти исключительно птицами средней величины (голубями, чайками, скворцами, грачами и т.д.), редко млекопитающими [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций. Незаконное изъятие кладок яиц и птенцов в коммерческих целях.


Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств, ужесточение штрафных санкций при разорении гнезд, установка птицевозащитных устройств на опорах ЛЭП. Гнездовые территории охраняются в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1926; 6. Гизатулин, Ильяхов, 2000.

Составитель И.И. Гизатулин.



КОБЧИК



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Кобчик – *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.

Краткое описание. Мелкий острокрылый сокол. Самец аспидно-черный с рыжими «штанами» и подхвостьем, лапы красные. У самки верх серый, с поперечной рябью, низ охристый, голова рыжая, хорошо заметны небольшие «усы». Молодые сверху темнее, снизу светло-охристые, с размытыми продольными пестринами, голова тускло-рыжая [1].

Распространение. В России кобчик распространен в степях и лесостепях. За пределами ареал простирается от Средней и Восточной Европы (Румыния, Венгрия, юг Болгарии, Югославия) до Монголии, Приморья и северо-восточного Китая. Зимует главным образом в тропической и Южной Африке (кроме того, в Южной Азии – от Индии до Китая) [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики [3]. В прошлом Л.Б. Беме отмечал кобчика на гнездовании в районе Кизляра [4]. Вместе с тем в сопредельной Ингушетии регистрировал исключительно в период весенних и осенних миграций [5]. Н.А. Рашкевич приводил его как редкий вид [6]. Современное территориальное размещение приурочено к равнинной зоне республики. В 70-е годы прошлого столетия численность кобчика возросла в связи с формированием зрелых лесополос вдоль автодорог и сельхозугодий с наличием крупных грачевников, которые являются для них основными гнездовыми станциями. В некоторых грачевниках встречаются колонии кобчиков в несколько гнездовых пар. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 60 пар. На миграциях

встречается не менее 300 особей.

Особенности биологии. На местах гнездования появляется поздно, в конце апреля – начале мая, что связано с питанием кобчика преимущественно насекомыми. Обычно кобчики используют гнезда врановых птиц, и в особенности грачей, а также сорок и ворон. В грачевниках нередко образуют небольшие колонии. Кладка в конце мая – июне состоит из 5-7 ржаво-красных пестрых яиц. Насиживание производится с первого яйца, длительность его 28 дней. Насиживают и самка, и самец. С середины июля до начала августа происходит вылет птенцов. Выводки держатся у гнезд около двух недель, после чего откочевывают. Отлет и осенний пролет наблюдаются в конце августа – первой половине сентября. В республике наиболее поздняя встреча отмечена 26 октября 1988 г. в районе ст. Ассиновской [7]. Основной корм кобчика – насекомые (саранча и кобылки, стрекозы, жуки), а также мелкие млекопитающие – мышевидные грызуны и ящерицы [1].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение гнезд. Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий, обработанных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.

Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ, как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде, в Красный список МСОП-2007. Необходимы природоохранные пропаганда среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защите сельскохозяйственных растений от вредителей.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1926; 6. Рашкевич, 1990; 7. Гизатулин, Ильяхов, 2000.

Составитель И.И. Гизатулин.

ПУСТЕЛЬГА СТЕПНАЯ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

Пустельга степная – *Falco naumanni* (Fleischer, 1818)

Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.


Краткое описание. Очень похожа на обыкновенную пустельгу, но мельче и стройнее. У самца верх красновато-коричневый без пестрин, голова темно-сизая, низ с редкими мелкими пестринами, по хвосту черная полоса. Когти белые. «Усы» не заметны. [1].

Распространение. Вне России обитает в Южной Европе, Северо-Западной Африке, Малой Азии, Иране, Афганистане, Китае. На территорию России заходят небольшие участки северной и восточной частей ареала. В XIX - первой половине XX века степная пустельга была сравнительно обычным, ландшафтным видом степной и лесостепной зон России. Область ее распространения простиралась от сухих предгорий Северного Кавказа и юга европейской части на западе до Алтая и Саян на востоке. В Предкавказье и северо-западном Прикаспии вид был обычен вплоть до конца 60-х годов XX в., но затем почти повсеместно исчез. Лишь отдельные пары продолжают гнездиться в степных р-нах [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прежние времена этот сокол был обычной, местами многочисленной птицей региона, населявшей полупустынные степи Терско-Кумского междуречья и субальпийский пояс в горной зоне [3, 4, 5, 6]. В настоящее время степная пустельга редкая птица. Гнездовые станции приурочены в основном к постройкам человека. На равнине - к фермам и кошарам к северу от Терека, в горной зоне – к средневековым строениям аридных котловин межгорных впадин (Итум-Калинская, Макажойская и др.). Гнездовая численность, по экспертной оценке, составляет около 20 пар [7, 8]. Вид потенциально охраняется в Степном и Шатойском заказниках.

Особенности биологии. Населяет различные типы равнинных и всхолмленных ландшафтов степей и полупустынь. В небольшом числе проникает в юж. лесостепь и пустыни. В горах – нижний пояс и предгорья. В период размножения распространена спорадично, в соответствии с наличием пригодных для гнездования мест. Селится колониями, насчитывающими от немногих до нескольких десятков пар. Гнездится в расщелинах и нишах скальных обнажений низкогорий, норах глинистых береговых обрывов рек и оврагов. На равнинах издавна, с конца палеолита, связана с сооружениями человека. На пролете встречается в открытом ландшафте. Экология на территории России изучена недостаточно. В кладке от 2 до 7, чаще 4-5 яиц. В выводке 3-5 птенцов. В питании доминируют насекомые (кузнечики и саранчовые, жуки, стрекозы). Нередко значительную долю составляют грызуны (полевки, мыши, молодые суслики) и рептилии (круглоголовки, ящурки, прыткая ящерица), изредка мелкие птицы. Дальний мигрант. Зимует в Африке южнее Сахары, нерегулярно в Южной Азии [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение гнезд. Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий, обработанных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.



Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы природоохранная пропаганда среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защите сельскохозяйственных растений от вредителей.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Беме, 1950; 7. Гизатулин, Ильях, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001; **Составитель** И.И. Гизатулин.

ТЕТЕРЕВ КАВКАЗСКИЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Куриные – Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

Тетерев кавказский – *Lyrurus mlokosiewiczi* (Taczanowski, 1875)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Похож на обыкновенного тетерева, но мельче, окраска матово-черная, без блеска, концы «лиры» изогнуты вбок и вниз. Брови красные. Самка рыже-бурая, с черным поперечным рисунком [1].

Распространение. Эндемик Кавказа. Высокогорная часть Большого Кавказа. В этих границах встречается в субальпийском и альпийском поясах гор Краснодарского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана. Вне России гнездится в Азербайджане, Армении, Грузии, Турции [2].

Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица республики. Населяет склоны с луговым разнотравьем субальпийского высотного яруса, тяготея к зарослям различных кустарников у верхней границы леса Скалистого и Бокового хребтов. Гнездовая численность относительно стабильна и, по экспертной оценке, составляет около 1500 пар [3, 4]. Повсеместное сокращение в последние годы поголовья скота на горных пастбищах, предполагает возможность возрастания численности.

Особенности биологии. Оседлый вид. Встречается у верхнего предела лесной растительности (березовое и буковое криволесье, разреженные сосняки), субальпийские кустарники (можжевельник, рододендрон), субальпийские и

альпийские луга на высотах 110-3300 м н.у.м. Гнезда устраивает на земле, среди субальпийских кустарников или на луговых склонах. В кладке 6 яиц, которые самка насиживает 25 дней. Полигам. Самцы начинают размножаться на 2-м году, самки – на 1-м году жизни. Взрослые птицы питаются в основном растительной пищей, в состав которой входят хвоя пихты, хвоя и шишкочернобыльника, почки березы, вегетативные части и семена травянистых растений, плоды черники, брусники, водяники. Птенцы питаются преимущественно насекомыми [2].

Основные лимитирующие факторы. Основные причины сокращения ареала и численности на Кавказе – изменение облика местообитаний (уничтожение горных лугов в результате перевыпаса домашних животных, прокладка автодорог, расширение населенных пунктов), увеличивающийся фактор беспокойства, прямое преследование. Степень уязвимости в Чеченской Республике

низкая. Основной фактор – рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики. Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007. Охраняется в Веденском заказнике Чеченской Республики. Необходимо проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

УЛАР КАВКАЗСКИЙ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Куриные – Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

Улар кавказский – *Tetraogallus caucasicus* (Pallas, 1811)

Категория и статус. III – редкий вид. Эндемик Кавказа.


Краткое описание. Окраска буровато-серая, с рыжими пестринами. На спине, на груди и брюхе черные и охристые поперечные и V-образные пестрины, брюхо темное, горло и передняя часть шеи белые. Клюв черный, лапы оранжево-желтые [1].

Распространение. Область распространения уларов ограничивается альпийской зоной Главного Кавказского хребта. Здесь они встречаются от верхней границы альпийских лугов до пределов вечного снега, охватывая районы от 1800 до 4000 м над уровнем моря [2].

Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица республики. Населяет альпийский и субнивальный высотный ярусы в пределах от 2600 до 3600 м, включая всю высокогорную часть Чеченской Республики. Основные ландшафты, к которым приурочено его гнездование, здесь представлены двумя типами: альпийскими и плотнoderновыми лугами из злаково-осоковых и разнотравно-злаковых ассоциаций и скально-осыпными обнажениями коренных пород по расчлененным склонам и отроговым долинам. По данным последних исследований, численность улара находилась в стабильном состоянии и составляла в среднем 2,2 особи на учетных 5-километровых маршрутах [3, 4]. Экспертная оценка численности – до 2500 гнездовых пар.

Особенности биологии. Местообитания улара – крутые каменистые россыпи и скалистые ущелья с редкой и скудной высокогорной растительностью, чередующиеся с полянами, поросшими низкой альпийской травянистой растительностью. Предпринимает небольшие сезонные вертикальные кочевки. В апреле самка приступает к устройству гнезда и откладке яиц. В полной кладке 5-8 яиц серо-зеленовато-голубоватой окраски, с коричневыми точками и пятнами. Яйца откладываются через день, иногда через два дня. Насиживает только самка. Насиживание длится 28 дней. Рост и развитие птенцов происходит быстро. К 2,5-3 месяцам жизни они достигают размеров взрослых птиц. В пищу употребляют только наземные части альпийских растений – листья, стебли, молодые сочные побеги, бутоны, цветы, почки и семена. В пищевом рационе описываемого вида зарегистрировано около 70 видов растений. Из них наибольший удельный вес занимают злаки и осоки, на втором месте стоят бобовые, затем гвоздичные [1].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости в Чеченской Республике средняя. Ос-



новной фактор – рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики и случаи незаконного отстрела. Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется.

Меры охраны. Охраняется в Веденском заказнике Чеченской Республики. Необходимы проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения, правовое и материальное усиление роли госохотинспекции в проведении рейдов.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Точиев, Гизатулин, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ФАЗАН СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Куриные – Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

Фазан северокавказский – *Phasianus colchicus septentrionalis* (Lorenz, 1888)

Категория и статус. III – редкий подвид. Эндемик Северного Кавказа и Предкавказья.

Краткое описание. Размеры крупные (крупнее вороны). Хвост клиновидный, очень длинный, особенно у самцов. Около глаза участок голй красной кожи, перья по бокам головы удлинены. Окраска яркая, медно-красная, на спине, груди и боках крупные черные поперечные пестрины, голова сине-зеленая, с металлическим блеском. Самка серовато-бурая, на груди, боках и спине темные поперечные пестрины, хвост значительно короче [1].

Распространение. Северный Кавказ к северу до устья Кубани (в настоящее время здесь уже не встречается) и дельты Волги. К югу до среднегорных областей северного склона Большого Кавказа и по побережью Каспийского моря до долины Самура. В настоящее время обитает в территориально изолированных популяциях (преимущественно в восточном Предкавказье), не образующих бывшего единого поселения [2].

Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица республики. В прошлом М.Н. Богданов [3], Л.Б. Беме [4, 5] находили фазана в долине Терека особенно многочисленным. Современное территориальное размещение носит мозаичный характер и приурочено к пойменным лесам Терека, Сунжи, Аргуна и Ассы с притоками, в равнинной зоне республики. Численность фазана в большой степени зависит от неблагоприятных климатических факторов, и, как следствие, часто выражены ее годовые колебания. Вместе с тем большое влияние на его численность оказывают и хищники. Так, по

данным Т.Ю. Точиева [6], анализ содержимого 32 желудков шакалов из Старосунженского заказника показал наличие остатков фазана в 28% желудков. Встречался фазан и в желудках обыкновенной лисицы и лесного кота. По данным последних исследований, численность фазана составляла в среднем 4,0 особи на учетных 5-километровых маршрутах [7, 8, 9]. Экспертная оценка современной численности составляет до 600 пар.

Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет тугаи, кустарниковые заросли и леса по долинам рек. Моногам или частичный полигам. Гнездится по зарослям колючих кустарников и тростников. Гнездо на земле под укрытием кустов или травы. Кладка с апреля, состоит из 8-12 одноцветных зеленовато-оливковых яиц. Насиживает только самка [1]. В Старосунженском заказнике бывшей

ЧИАССР птенцы фазана регистрировались в конце мая - начале июня. Количество птенцов в выводке в среднем составляло 8,5. Смертность птенцов достигала 30% [10]. Держатся фазаны скрытно, по утрам и вечерам выходя кормиться на открытые места. От опасности предпочитают уходить пешком, взлетают лишь в случае крайней необходимости, бегают очень быстро, часто садятся на деревья. Питаются семенами и другими частями растений, насекомыми.

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Смертность в суровые снежные зимы. Гибель и разорение гнезд хищными животными. Беспокойство в период охоты, браконьерский отстрел. Весенние палы тростников. Вырубка лесов в водоохраных зонах. Возможна нежелательная гибридизация в случае выпуска в природу охотничьей породы фазана.

Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках, зеленой зоне г. Грозного. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [12, 13]. Необходим запрет весенней охоты, выжигания тростников и вырубки лесов прибрежной зоны рек и озер. Запрет интродукции охотничьего фазана на территории республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Точиев, 1970; 7. Точиев, Гизатулин, 1987; 8. Точиев, Гизатулин, 1989; 9. Гизатулин и др., 2001. 10. Осмоловская, 1979; 11. Красная книга РФ, 2001; 12. Гизатулин, 2006; 13. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

КРАСАВКА

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae


Красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. V – восстанавливающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Мелкий (заметно мельче серого) журавль. Окраска сизо-серая, голова, шея и концы крыльев черные, по бокам головы пучки длинных, рассученных белых перьев – «косиц». Участков голой кожи на голове нет. Клюв желтоватый, ноги черные. Молодые тусклее и бурее [1].

Распространение. Область гнездования охватывает степные и полупустынные районы Европы и Азии, от Турции и юга Украины до Северо-Западного Китая и Монголии; в Марокко. В европейской части России – Саратовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, восточное Предкавказье [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Как в прошлом [3], так и в настоящее время обычная птица, населяющая полупустынные ландшафты Терско-Кумского междуречья [4,5,6]. На осеннем пролете встречается по всей территории республики, включая горную часть, где по магистральным ущельям крупных рек преодолевает горную преграду. В связи со снижением поголовья скота, численность популяции возросла и в настоящий период стабилизировалась, в связи с дефицитом гнездопригодных территорий. Экспертная оценка составляет до 200 пар [7]. Так как степень уязвимости в настоящее время невысокая, то снижение численности в бли-



жайшей перспективе не предполагается.

Особенности биологии. Предпочитает целинные типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи, с низким травостоем, щебнистые, твердые глинистые участки и солонцы. Пары постоянные. Возвращаются с мест зимовки в марте – первой половине апреля. Яйца в гнездах наблюдаются с конца апреля – в первой декаде мая. В районе Кизляра кладки Л. Б. Беме встречал в начале мая [8]. В кладке 1-3, чаще 2 яйца. После рождения птенцы ведут бродячий образ жизни. Кроме размножающихся особей, в степи встречаются неполовозрелые и холостые особи, которые могут держаться парами или сбиваться в стаи, достигающие до нескольких десятков особей. Питаются частями растений, насекомыми, мелкими позвоночными. [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Основной лимитирующий фактор – беспокойство птиц в период гнездования и гибель кладок.

Меры охраны. Вид занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимо проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения. Гнездовые территории охраняются в Степном заказнике республики.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Точиев, Гизатулин, 1989а; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Беме, 1925.

Составитель И.И. Гизатулин.

СУЛТАНКА



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Пастушковые – Rallidae


Султанка – *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на периферии ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Несколько крупнее лысухи, клюв массивный, сжатый с боков. Ноги высокие, пальцы без плавательных перепонки. Окраска зеленовато-голубая, с металлическим отливом, подхвостье белое. Ноги, клюв и «бляшка» на лбу оранжево-красные [1].

Распространение. В России находится самый северный выступ ареала. Заселяет отдельные участки западного Каспия, на север до дельты Терека и, возможно, системы Прорва-Таловка. Гнездится в дельте Волги. Не указан для Калмыкии, но мог проникнуть сюда в последнее десятилетие в связи с развитием тростникового бордюра вдоль Каспийского побережья. Вне побережий Каспия отмечен в Нефтекумском районе Ставропольского края и в Яшалтинском районе Калмыкии. Ареал в пределах России пульсирующий: вид исчезает из северных очагов размножения после серии морозных зим и вновь заселяет их после ряда мягких зим [2].

Места обитания и численность. Предположительно гнездящийся, редкий зимующий вид республики. До середины прошлого века никем из исследователей на территории республики не отмечался [3, 4, 5 и др.]. По данным П.С. Анисимова [6], в гнездовой период султанки отмечались в 80-е годы на озерах Степная жемчужина, Чебутла, уро-



чище Киссык и Парабочевском заказнике, однако факт гнездования не подтвержден. И.И. Гизатулин встречал султанку на озерах Степная жемчужина теплой зимой 1983 г. и отмечал ее как редкий зимующий вид [7]. Ключевые места возможного гнездования и зимовок – озеро Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык, тростниковые бордюры поймы Терека.

Особенности биологии. Основное местообитание – тростниковые заросли с открытыми плесами. Встречается в рогозовых зарослях и на кустарниковых болотах. Зимой нередко кормится на открытых пространствах, где сохраняются зеленые растения – в степи, на полях люцерны и т.п. Вид в основном оседлый, но из дельты Волги зимой откочевывает, в холодные зимы, по-видимому, откочевывает и из Дагестана. Гнездится в тростниках на заломленных стеблях. Размер кладки 4-5 яиц, кладка обычно одна за сезон. Основа питания – растения, прежде всего молодые побеги тростника, зимой может кормиться падалью [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы – весенние палы тростников, неблагоприятные климатические условия, беспокойство и незаконный отстрел.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Урочище Киссык и озеро Степная жемчужина выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [8, 9]. Необходима организация ООПТ на ключевых местах возможного гнездования и зимовок (озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык), запрет выжигания тростников, весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Гизатулин, 2006; 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ДРОФА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДВИД

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Дрофиные – Otidae

Дрофа, европейский подвид – *Otis tarda tarda* (Linnaeus, 1758)


Категория и статус. III – редкий подвид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Очень крупная птица. Голова и шея серые, спина рыжая, с поперечным рисунком, брюхо беловатое, крылья белые с темными концами. У самцов на горле пучки нитевидных перьев – «усы» [1].

Распространение. В настоящее время ареал сократился и имеет очаговый характер. Самый западный участок находится на стыке Ростовской и Воронежской областей. Наиболее крупная и достаточно благополучная популяционная группировка населяет Нижнее Поволжье (Ульяновская, Самарская, Саратовская и Волгоградская обл.). Южнее располагается изолированный маньчжурский очаг (Калмыкия и северо-восток Ставрополья). Еще южнее – малочисленный предкавказский очаг. Довольно крупный участок ареала лежит в степных районах Северного Прикаспия и Приуралья (Оренбургская обл.). Угасающая популяция дрофы обитает в степях Предалтайской равнины. Вне России обитает на Украине, в Казахстане, Восточной Европе, Испании, Португалии, Турции, Иране [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики. В прошлые времена, вплоть до 50-х гг. XX века, дрофа была обычной, местами многочисленной птицей равнинной части [3, 4, 5]. В настоящее время встречается только в сухих полупустынных степях Терско-Кумской низменности в пределах степного заказника. Современная численность гнездящихся





птиц не превышает 5-7 пар [6]. Численность на миграциях 30-40 особей. В перспективе, при благоприятных условиях, восстановление популяции возможно на плакорах Терского и Сунженского хребтов, где дрофа гнездилась в 50-е годы прошлого столетия.

Особенности биологии. Типичный биотоп – злаковые степи и широкие луга, не избегает сухих грив среди заболоченных территорий и песков с лугоподобными участками. В современных условиях гнездится на полях агрокультур (пшеница, ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник, картофель), пашнях и пастбищах. Половая зрелость самцов на 5-6-й, самок – на 3-4-й год. Гнездо – неглубокая ямка в почве. В полной кладке 2, реже 3 яйца. Насиживает только самка 26-28 суток. Кормится различными насекомыми, реже мелкими позвоночными, побегами и семенами трав и агрокультур. В благоприятные зимы часть птиц зимует в местах гнездового ареала. С территории России летит на зимовки в Крым, Турцию, Закавказье, Иран, Пакистан, Афганистан [2].

зье, Иран, Пакистан, Афганистан [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.

Меры охраны. Занесена на уровне вида в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей средства. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

СТРЕПЕТ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Дрофиные – Otididae

Стрепет – *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Самая мелкая из дроф (с курицу). Украшающих перьев нет. Спинная сторона серовато-охристая, с темным струйчатым рисунком, брюшко белое, шея черная, с двумя узкими белыми «ошейниками», крыло с белым большим «зеркалом» и темным концом. У самки шея буроватая с пестринами, «ошейников» нет. Зимой самец окрашен, как самка [1].

Распространение. В настоящее время ареал разорван, представлен изолированными, нередко точечными очагами. Оби-

тает в Среднем и Нижнем Поволжье. Самая восточная гнездовая группировка, вероятно, сохранилась в степях Южного Приуралья. Единично встречается в Липецкой и Воронежской областях. Населяет Волго-Донское междуречье, Нижний Дон, Предкавказье, Калмыкию. В Дагестане ранее был обычен на пролете, сейчас пролет выражен слабо. Единично гнездится в Кизилпортовском р-не. В бывшей Чечено-Ингушетии встречается только в степях Шелковского и Наурского районов. Вне России

обитает в Северо-Западной Африке, Испании, Португалии, Франции, Италии, Австрии, бывшей Чехословакии, Украине, Малой Азии, Иране, Афганистане, Казахстане. [2].

Места обитания и численность. Гнездящаяся, пролетная и зимующая птица. В прошлом, по сведениям М.Н.Богданова [3], Л.Б.Беме [4], это был обычный, местами многочисленный вид. Согласно учету добычи дичи в 1960-1961 гг. на территории Чечено-Ингушетии стрепет добывался охотниками чаще, чем в других районах РСФСР. Так, тридцатью охотниками из 238 опрошенных было добыто 72 стрепета [5]. В настоящее время стрепет встречается исключительно в полупустынных степях Терско-Кумской низменности. Общая численность, по экспертной оценке, – до 150 пар [6, 7, 8]. В настоящее время гнездовая численность постепенно увеличивается, в связи с повсеместным сокращением поголовья скота и восстановлением растительных сообществ.


Особенности биологии. Целинные, залежные участки степи, остепненные полупустыни с невысокой разреженной, но разнообразной травянистой растительностью. Избегает высокого травостоя. Половой зрелости достигает в возрасте около 2 лет, самки, возможно, раньше. Устойчивых пар не образует. В кладке 3-4 яйца. Насиживает только самка. Длительность инкубации 20-22 дня. Вылупление птенцов длится 1-2 суток, после чего самка уводит выводок от гнезда. В возрасте 40 дней птенцы способны к полету. На кочевках молодые и старые птицы собираются в группы. Питание смешанное: проростки, бутоны, цветки, листья растений, различные насекомые, особенно прямокрылые, иногда мелкие позвоночные; кормится на полях всходами озимых [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в гнездовой период, браконьерство и сокращение гнездовых стаций.

Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимо внедрить в практику специальные правила проведения сельхозработ, предотвращающие отравление и гибель птиц. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Иванов, Приклонский, 1965; 6. Гизатулин и др., 2001. 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 8. Точиев, Гизатулин, 1990.

Составитель И.И. Гизатулин.



АВДОТКА

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Авдотковые – Burhinidae

Авдотка – *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. IV – вид с неопределенным статусом. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупная птица с трехпальными ногами, коротким клювом и большими желтыми глазами. Спинная сторона песчано-серая с темными продольными пестринами. Клюв желтый, с черной вершиной. В полете на крыле две отчетливых белых полосы, у сидящей птицы только одна [1].

Распространение. В настоящее время обитает на пространствах от долины среднего течения Дона до долины Волги к югу от 50° с.ш. и юге Оренбургской обл. Более регулярно



вид встречается на территории Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края. Зарегистрированы залеты авдотки в Сибирь. Вне России обитает в Западной Европе, Казахстане, Средней Азии, Северной Африке, Юго-Западной и Южной Азии. [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид [3]. В прошлом весьма обычная птица Ногайских степей и дельты Терека [4,5]. Современное гнездование вида в Чеченской Республике сплошное и охватывает полупустынные степи Терско-Кумской низменности и, частично, выделы целинных и залежных земель к югу от Терека, включая отроги Терского хребта. Ключевое место гнездования – территория Степного заказника. Мигрирует по всей низменности. В последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота численность возрастала и стабилизировалась. На учетных маршрутах в бурунных степях в среднем отмечалось 1,4 особи. Общая гнездовая численность, по экспертной оценке, составляет до 200 пар [6, 7].


Особенности биологии. Населяет степи, полупустыни, пустыни. Места обитания открытые, обеспечивающие хороший круговой обзор. Отсутствие препятствий для бега, глинистая или песчаная сухая поверхность почвы и близость источника воды (не далее 20 км) являются необходимыми условиями, при которых вид селится даже среди древесно-кустарниковой растительности. Питается животной пищей. Один выводок в сезон, иногда 2. В кладке 1-3 яйца, обычно 2. Насиживание 24-26 (до 27) дней, подъем молодых на крыло через 36-42 дня. Максимальный возраст 15 лет 9 месяцев [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, отстрел, выпас скота на местах гнездования.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимы запрет весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин, 1987; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.



ЗУЕК КАСПИЙСКИЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Ржанковые – Charadriidae

Зуек каспийский – *Charadrius asiaticus* (Pallas, 1773)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный и длинноногий зуек. Верх головы и тела серовато-бурый, лоб, полоса над глазом, бока головы и горло белые. Грудь рыжая, снизу окаймлена черной полоской. Брюхо и подмышечные перья белые. Клюв черный, ноги зеленовато-бурые. У самки грудь серовато-желтая без черной оторочки, зимой буроватая [1].

Распространение. Гнездится по южной окраине России. Населяет пустыни и полупустыни Прикаспийской низменности. Известны находки в низовьях р. Илек на юге

Оренбургской области. Вне России обитает в Казахстане, Средней Азии, возможно, в Ираке. [2].

Места обитания и численность. Редкий гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики.

В прошлом в пределах Ногайских степей и дельты Терека этого зуйка отмечали в гнездовой период М.Н. Богданов [3] и И.Б. Волчанецкий [4]. В последние годы морские зуйки в небольшом числе встречались в бурунных степях Терско-Кумской низменности. Современное гнездование очаговое и приурочено к берегам соленых, свободных от макрофитов водоемов, и артезианам. Отводящая от гнезда пара этих зуйков наблюдалась у артезиана в районе озера Степная жемчужина 6 апреля 1984 г. На учетных маршрутах в бурунных степях в среднем отмечалась 1 особь. Экспертная оценка гнездовой численности – до 15 пар. Ключевые места гнездования – территории урочища Киссык и Степного заказника [5, 6].


Особенности биологии. Обитает в глинистых и каменистых пустынях с редким, низким травостоем и участками солончаков по депрессиям или берегам водоемов. Гнездится небольшими рассредоточенными колониями или отдельными парами. В кладке обычно 3 яйца. Питается беспозвоночными, в основном насекомыми (жуками, саранчовыми, личинками мух). Зимует в речных и озерных долинах на Ближнем Востоке и в Африке [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство и выпас на местах гнездования (гибель кладок и птенцов в результате вытаптывания скотом).

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Урочище Киссык выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [7]. Необходимы регулируемый выпас скота, усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



ХОДУЛОЧНИК

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae


Ходулочник – *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный кулик с тонким прямым клювом на непропорционально длинных ногах. Окраска контрастная. Верх головы, спина и крылья черные, весь низ и хвост белые. Ноги красные. У самки черный цвет на спине и голове бурее, а у молодых серее [1].

Распространение. Населяет равнины Предкавказья и Прикаспийской низменности на север до Среднего Дона, юг Саратовской и юг Оренбургской обл. Небольшими изолированными колониями встречается в Зауралье – по степному югу Сибири – в Барабе, Кулунде, на Алтае, в Даурии и на юге Дальнего Востока у оз. Ханка. Основная гнездовая популяция сосредоточена в Предкавказье по солоноватым озерам Приазовья, долины Маныча и Прикаспия. Вне России ареал охватывает Северную и Южную Америку, Африку, Мадагаскар, Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею, страны Европы и Азии. [2].





Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид. В прошлом обычная, местами многочисленная птица [3, 4, 5]. Населяет свободные от макрофитов стоячие водоемы равнинной зоны республики. Ключевые территории – озера Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майорское, Генеральское, урочище Киссык [6, 7, 8]. В последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота численность возрастала и стабилизировалась. По экспертной оценке, гнездовая численность около 150 пар. [9]. Современная численность на миграциях – до 2000 особей.

Особенности биологии. Гнездится по открытым илистым берегам солоноватых и пресных водоемов степной и пустынной зон, иногда – на травянистых болотах, на солончаках в долинах рек и озер и т.п. Гнездится плотными колониями, нередко вместе с другими видами куликов и крачек. В кладке 4, редко 3 яйца. На зимовки основная масса птиц отлетает

вскоре после подъема молодняка на крыло, но поздние выводки изредка задерживаются до осени. Питается водными насекомыми и их личинками [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивный выпас скота в местах колониального гнездования, беспокойство и вытаптывание гнездовых кладок. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов, либо к резким колебаниям уровня вод, с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготовления чучел.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [10, 11, 12]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах массовых колониальных гнездовий, запрет весенней охоты, усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1989; 8. Точиев, Гизатулин, 1989; 9. Гизатулин и др., 2001; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 11. Гизатулин, 2006а; 12. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.

ШИЛОКЛЮВКА



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный кулик на высоких ногах и с длинным, тонким, сильно изогнутым вверх клювом. Окраска контрастная: верх головы и шеи, полосы на крыльях и концы их черные, все остальное – белое. Ноги синеватые [2].

Распространение. Гнездится по южной окраине России. Обитает на водоемах Предкавказья и Прикаспийской низменности. Кроме того, небольшие поселения известны на степных озерах Зауралья – в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областях и по степному югу Сибири – в Барабе, Кулунде, Хакасии, Туве, Даурии. Вне России

обитает на Украине, в Казахстане, странах Европы, Азии, Африки. [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный, вид республики. В прошлом шилоклювка была обычна по берегам соленых озер [3, 4]. В настоящее время это редкая птица, населяющая мокрые солончаки и соленые озера в пределах Терско-Кумской низменности [5]. Ключевые территории – разливы озер Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык [6, 7]. В последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота численность возрастала и стабилизировалась. Экспертная оценка численности – до 30 пар [8]. Современная численность на миграциях – до 200 особей.

Особенности биологии. Населяет открытые острова и побережья солоноватых озер и морей в степной и пустынной зонах. Гнездится крупными, плотными колониями, часто вместе с ходулочником и другими куликами. Избегает близости с человеком.


К гнездованию приступает в 2-3-летнем возрасте. В районе ст. Старогладковской самка с готовым к снесу яйцом добыта Л.Б. Беме 25 мая, через два месяца (12 июня) птенцы держались еще с родителями [4]. В кладке 4 яйца. Питается почти исключительно мелкими ракообразными, обитающими на мелководьях в теплой соленой воде (артемией, гамарусом, циклопами), а также личинками двукрылых, жуками, моллюсками [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы аналогичны ходулочнику. Интенсивный выпас скота в местах колониального гнездования, беспокойство и вытаптывание гнездовых кладок. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов либо к резким колебаниям уровня вод с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготовления чучел.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [9, 10]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах массовых колониальных гнездовий, запрет весенней охоты, усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Гизатулин, Точиев, 1987; 6. Гизатулин, Точиев, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 8. Гизатулин и др., 2001; 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 10. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



КУЛИК-СОРОКА (МАТЕРИКОВЫЙ ПОДВИД)

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae


Кулик-сорока (материковый подвид) – *Haematopus ostralegus longipes* (Buturlin, 1910)

Категория и статус. III – редкий, спорадически распространенный подвид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный, плотного сложения кулик, с длинным прямым ярко-красным клювом и невысокими красными ногами. Окраска контрастная: верх и грудь черные, низ белый [1].

Распространение. Ареал занимает центр и юг европейской части России, Западную и частично, Среднюю Сибирь. В





пределах ареала, особенно в европейской части, встречается спорадически. Относится к дальним мигрантам, зимует на побережьях Красного моря, Персидского залива, Индии, Восточной Африки, Средиземного моря [2].

Места обитания и численность. Редкий пролетный, предположительно гнездящийся вид республики. В прошлом М.Н. Богданов находил этого кулика обычным на пространстве всего Кавказа [3]. Л.Б. Беме находил его на гнездовании на разливах Терека между сел. Беслан и колонией Михайловской [4]. В Чеченской Республике кулик-сорока изредка встречался по берегам водоемов равнинной зоны, исключительно на весеннем и осеннем пролете [5]. Предполагается возможность гнездования на островах, косах, отмелях в поймах рек Терек, Сунжа, Аргун. Современная численность на миграциях не более 100 особей.

Особенности биологии. Кулик-сорока – узкий стенобионт, гнездящийся преимущественно по морским побережьям, в

хорошо разработанных долинах крупных и средних рек, по береговой линии пресных и соленых озер на участках, имеющих слабо закрепленную растительностью песчано-галечниковые отмели, косы, острова. Гнездится одиночными парами, в отдельных случаях совместно с малыми и речными крачками. В кладке 2-4, чаще 3 яйца. Одна кладка в сезоне. Питается беспозвоночными (ракообразные, моллюски, насекомые) [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, чувствительность к фактору беспокойства.

Меры охраны. Занесен в Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Парабочевском заказнике. Необходимо выявление мест на гнездовании и включение их в территории с ограниченным хозяйственным и рекреационным использованием и адресной охраной.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

КРОНШНЕП БОЛЬШОЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДВИД)



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Кроншнеп большой (европейский подвид) – *Numenius arquata arquata* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Размеры крупнее вороны. Окраска буроватая, с черными пестринами, на голове и груди узкие продольные пестрины, надхвостье белое, иногда с пестринами [1].

Распространение. Ареал подвида охватывает территории от Британских островов и Франции на запад до Урала и Волжско-Уральского междуречья на востоке. На севере распро-

странен до северной Скандинавии, Кандалакшского залива, Архангельска, долины Пинеги, низовьев Ижмы, долины Усы. Южная граница ареала проходит от центральной Франции, Швейцарии до устья Дуная, северных побережий Черного и Азовского морей, долины Маныча, в долине Волги до 48° с.ш., далее до Камыш-Самарских озер. Места зимовок расположены в Африке, Средиземномо-

рье, Закавказье, Персидском заливе [2].

Места обитания и численность. Пролетный, предположительно гнездящийся вид республики [3]. В прошлом отмечался как обычная птица в период миграций [4] и в небольшом числе в гнездовое время (неполовозрелые летающие птицы) в районе Ногайских степей [5, 6]. По данным Ю.Е. Комарова, гнездится в степях окрестностей пос. Кочубей сопредельного Дагестана [7]. В Чеченской Республике известна единственная находка полной кладки этого кроншнепа П.С. Анисимовым 2 июня 1967 г. в урочище Киссык [8]. На пролете предпочитает берега водоемов, используя для отдыха и кормежки побережья и мелководья крупных озер, рек, водохранилищ, рыбных хозяйств, прибрежные влажные луга и сельскохозяйственные угодья, участки степей. Достоверная гнездовая численность неизвестна. Летает до 80 особей. Современная численность на миграциях – до 20 особей.


Особенности биологии. Заселяет луга, болота больших речных пойм, степные болота, участки степей и лугов у водоемов. Моногам, имеет одну кладку в году. Гнездится отдельными парами или небольшими рыхлыми поселениями по несколько пар. Гнездо на земле, в кладке 4, реже 3 яйца. Насиживание 26-29 дней. Молодые начинают летать в возрасте 5-6 недель, покидают район гнездования позднее взрослых птиц. Питается в период гнездования беспозвоночными и мелкими позвоночными – лягушатами, ящерицами, в период миграции (особенно осенью) еще и растительной пищей – семенами осок, земноводной гречихи, ягодами [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, чувствительность к возросшему фактору беспокойства, незаконный отстрел в период миграций.

Меры охраны. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [9, 10, 11]. Необходимы специальные исследования возможного гнездового размещения и численности, запрет весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Комаров, 1985; 8. Анисимов, 1989. 9. Гизатулин, Джамирозев, 2006; 10. Гизатулин, 2006а; 11. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



ТИРКУШКА СТЕПНАЯ

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Тиркушковые – Glareolidae


Тиркушка степная – *Glareola nordmanni* (Nordmann, 1842)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Среднего размера и своеобразного облика кулик. Верх и грудь дымчато-бурые, горло бледно-ржавчатое, брюхо белое. Испод крыла черный. У сходного вида луговой тиркушки испод крыла рыжий. Молодые с черными пестринами на спине [1].

Распространение. В прошлом вид был широко распространен в степной зоне, проникая к северу до р. Оки, Самарской





Луки, рек Камы и Белой, верховий р. Урал, Барабы, Кулунды и Чуйской степи. Сокращение ареала в Европе началось в XIX в. Вне России обитает в полосе степей от низовий Дуная до Средней Азии и Казахстана [2].

Места обитания и численность. Гнездящаяся, перелетная, пролетная птица, населяющая солончаки и прибрежные микроландшафты соленых озер полупустынной зоны республики [3]. В прошлом на гнездовании в пойме Терека эту тиркушку отмечали Л.Б.Беме [4] и И.Б. Волчанецкий [5]. Современная численность подвержена большим колебаниям по годам, ввиду непостоянства гнездовых стаций, и составляет до 150 пар [6]. Численность на миграциях – до 2000 особей.

Особенности биологии. Селится на солончаках и солончаках в долинах рек и по побережьям озер – на участках с пятнами голой земли среди низкой и редкой травянистой растительности, не препятствующей передвижению и обзору птиц.

Гнездится разреженными колониями от 2-3 до 200-300 и более пар, нередко вместе с другими куликами и крачками. В кладке 3-4 яйца. Питается различными беспозвоночными, которых весной собирает на земле среди колоний, а летом ловит, летая над землей или водоемами. В августе стаями охотится на массовых насекомых высоко в небе [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокорство, отстрел, лимит гнездопригодных биотопов. Колонии на пастбищах близ водоемов подвержены также сильному прессу и вытаптыванию домашним скотом, хищничеству врановых птиц, ливневым дождям и граду.

Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимы временное прекращение работ и выпаса скота в местах гнездования, запрет весенней охоты, природоохранная пропаганда среди местного населения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин, Точиев, 1989; 4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

КРАЧКА МАЛАЯ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Крачка малая – *Sterna albirostris* (Pallas, 1764)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Мелких размеров птица со светло-серым верхом, белым лбом, черной «шапочкой» и белым низом. Концы крыльев темные. Лапы желтые, клюв желтый с черным концом. У молодых «шапочка» сероватая, верх с пестринами, клюв бурый, с желтым основанием [1].

Распространение. Обитает на всех континентах, кроме Антарктиды. В России распространена широко, но везде гнездится спорадично, населяя интерзональные ландшафты

зоны смешанных лесов и юг тайги, зон степей и пустынь. Зимовки российских малых крачек находятся в Красном море, на южном побережье Аравии, в Персидском заливе, на побережье Ирана, Пакистана и западной Индии [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид, населяющий свободные от макрофитов соленые озера и мокрые солончаки полупустынных Терско-Кумских степей республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] и Л.Б. Беме [4] находили ее в большом количестве по Тереку и на водоемах Ногайских степей. В настоящее время немногочисленный вид, с многолетней пульсацией численности. По экспертной оценке, гнездится до 300 пар [5]. Стабилизация и рост численности маловероятны.


Особенности биологии. Заселяет морские побережья, реже реки и озера. Гнездится на намывных песчаных, илистых, ракушечных, солончаковых и реже галечниковых островах, отмелях, косах и материковых пляжах. Трофически вид связан с водоемами, основные кормовые объекты – мальки рыб и водные беспозвоночные. Гнездится колониями различной плотности и отдельными парами. Колония обычно менее 50 пар, чаще всего до 10-15 пар. Гнезда располагаются у самой воды. В полной кладке 1-4, чаще 3 яйца, размножение 1 раз в сезон [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов либо к резким колебаниям уровня вод с затоплением гнездовых колоний. Беспокойство в местах расположения колоний.

Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [6, 7, 8]. Необходимо усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.

Составитель И.И. Гизатулин.



ФИЛИН

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство СОВИНЫЕ – Strigidae

Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)


Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Очень крупная сова с хорошо развитыми «ушами». Верх от темно-рыжего до охристого, с черными пестринами. Грудь рыже-охристая, с продольными пестринами, на боках и брюхе тонкий темный поперечный рисунок. Лапы оперены до когтей. Глаза красновато-оранжевые [1].

Распространение. Широко распространенный в России вид. За ее пределами населяет Западную Европу, Северную Африку, Аравию, Среднюю, Центральную и Южную. Азию, исключая Индию и Индокитай [2].

Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики. В прошлом обычная [3, 4], в настоящее время редкая птица, населяющая ландшафты от равнинной полупустынной зоны





до межгорных впадин среднегорий Пастбищного и Скалистого хребтов [5]. Экспертная оценка численности – до 40 пар. Возрастание численности и уплотнение ареала в перспективе не предполагается.

Особенности биологии. Повсеместно оседлая птица, избегающая, как правило, близости человека. Гнездится на земле, на склонах и обрывах, на выходах скал, в крупных дуплах (лесная зона), брошенных постройках, развалинах. Средняя кладка из 2-3 яиц, редко из 5. Насиживание 34-35 дней, выкармливание в гнезде 60 дней. Пищевая специализация отсутствует, спектр питания – от рыб, амфибий, птиц, различных видов некрупных млекопитающих до молодняка копытных [2].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокорство в период охоты, незаконный отстрел как привлекательной птицы для таксидермических целей. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в заказниках. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицевозащитных устройств на опорах ЛЭП.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

СОРОКОПУТ СЕРЫЙ



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Сорокопут серый – *Lanius excubitor excubitor* (Linnaeus, 1758)

Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.

Краткое описание. Крупный (крупнее скворца) сорокопут. У взрослой птицы верх головы, спина и надхвостье светлые, пепельно-серые, широкая полоса от уха через глаз к уху, крылья и хвост черные, полосы по бокам хвоста, на крыльях и весь низ тела белые. У молодых птиц окраска верха с буроватым оттенком, а низ с неясным темным чешуйчатым рисунком [1].

Распространение. Северная и средняя полоса европейской части России и Западной Сибири на западе до долины Енисея на востоке. На юге контактирует с подвидом *L. e. homeyeri*. По последним данным, граница между подвидами проходит в европейской части страны по 51-й параллели до долины Волги, предгорий Южного Урала по 57-й параллели, в Западной Сибири граница идет по южным окраинам тайги до Енисея. В период сезонных перемещений и зимовок распространен в Скандинавии, Западной, Центральной Европе, на Украине, юге России, на Кавказе и Закавказье, Казахстане, Малой и Средней Азии [2].

Места обитания и численность. Пролетный и зимующий вид республики [3]. На гнездование серого сорокопута в окрестностях г. Махачкалы, сопредельного Дагестана указывает Е.В. Вилков [4]. По

данным А.К. Сатунина [5], Л.Б. Беме [6], Х.Т. Моламусова [7], на Северном Кавказе указанный подвид этого сорокопута зимует совместно с обитающим южнее подвидом *L. e. homeyeri*. Зимует по всей низменной зоне, и изменения территориального размещения в ее пределах не предполагается. Современная численность на зимовках в республике составляет около 200-250 особей и во многом зависит от климатических особенностей.


Особенности биологии. Населяет болотистые редколесья, опушки лесов у болот, озер, леса и кустарники по речным поймам, зарастающие вырубki и гари с отдельными деревьями, заболоченные луга с куртинами кустарников и деревьями. В период кочевок и зимовок встречается в антропогенном ландшафте, вплоть до окраин населенных пунктов. Гнезда на деревьях и кустах ивняка на высоте 1,7-18 м. В кладке 5-7, реже 4 и 8, до 9 яиц. Насиживает кладку почти исключительно самка 14-16 (возможно, 16-18) суток. Птенцы находятся в гнезде 17-20 суток. Питание: крупные беспозвоночные и мелкие позвоночные (земноводные, рептилии, воробьиные и мелкие млекопитающие) [2].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы на зимовках недостаточно выяснены.

Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы целевой мониторинг в местах постоянных зимовок и изучение лимитирующих факторов.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Вилков, 1998; 5. Сатунин, 1911; 6. Беме, 1926; 7. Моламусов, 1967.

Составитель И.И. Гизатулин.



ДРОЗД КАМЕННЫЙ СИНИЙ (КАВКАЗСКИЙ ПОДВИД)

Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Дрозд каменный синий (кавказский подвид) – *Monticola solitarius solitarius* (Linnaeus, 1758)


Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.

Краткое описание. Самец однотонного серовато-голубого цвета, крылья и хвост буро-черные. Самки и молодые буро-серые, с синим налетом на спине, охристым горлом и частыми поперечными темными полосками на груди, боках, спине [4].

Распространение. Евразия от Атлантического побережья Пиренейского полуострова к востоку до побережья Японского моря, Корейского полуострова, побережья Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Северо-Западная Африка от юго-западного Марокко к востоку до 20-го меридиана [2].

Места обитания и численность. Немногочисленная, гнездящаяся, перелетная, пролетная птица республики. П.С. Анисимов встречал синего дрозда в июне-июле в пойме Шаро-Аргуна в районе Кебасоя и по ущелью р. Ансалта во Веденском районе [3]. По последним исследованиям, населяет край своего ареала крайний юго-восток Чеченской Республики. Ключевая территория – Макажойская аридная котловина в Веденском районе с сухими склонами субальпийских ландшафтов, характерного ксероморфного облика. Биотопическая приуроченность вида не предполагает его дальнейшее





распространение в республике. На учетных маршрутах здесь отмечалось в среднем 0,2 особи этих дроздов [4]. Экспертная оценка гнездовой численности составляет не более 100 пар.

Особенности биологии. Населяет сухую горную степь субальпийской зоны. Держится в одиночку или парами на скалах, камнях и на земле. Гнездо строит между камнями или в трещинах скал. Кладка из 4-6 голубовато-зеленоватых, иногда с буро-красными крапинками, яиц в мае-июне [1].


Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Малоизученный вид в республике.

Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается. Необходимы целенаправленные исследования кадастра гнездового размещения, численности, возможных лимитирующих факторов.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001.

Составитель И.И. Гизатулин.

ГОРИХВОСТКА КРАСНОБРЮХАЯ (КАВКАЗСКИЙ ПОДВИД)



Тип Хордовые – Chordata

Класс Птицы – Aves

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Горихвостка краснобрюхая (кавказский подвид) – *Phoenicurus erythrogaster erythrogaster* (Guldenstadt, 1775)

Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид.

Краткое описание. Заметно крупнее других горихвосток. У самца верх головы и широкая полоса на крыле белые, спина, крылья, бока головы, горло и лоб черные, хвост, грудь, брюшко и надхвостье ржаво-красноватые. Самка и молодые буровато-серые, светлее снизу и с ржаво-рыжим хвостом. У молодых на темном оперении светлые пестрины [1].

Распространение. Эндемичный подвид, населяющий альпийскую область Большого Кавказа [2].

Места обитания и численность. Немногочисленная, гнездящаяся, оседлая и кочующая птица республики. Гнездовая территория спорадически занимает всю зону субнивального пояса гор. По сведениям П.С. Анисимова, в 1967 г. численность этой горихвостки составляла 2 особи на км², а в 1985 г. – 1,3 особи на км² [3]. По последним исследованиям, на учетных маршрутах здесь отмечалось в среднем 0,4 особи [4]. Дальнейшее территориальное распространение в республике в связи с биотопической приуроченностью вида не предполагается.

Особенности биологии. Местообитаниями являются скалы и осыпи с альпийскими лугами у границ вечных снегов. Держатся в одиночку, парами или разрозненными группами. Гнездо помещается в трещинах скал или между камнями. Кладка из 3-5 белых, с красноватыми крапинками, яиц в июне-июле. Гнезда с полными кладками П.С. Анисимов находил 7 июня 1972 г. в районе горной вершины Кериго. Слетков наблюдал в июле [3]. Зимой спускается по долинам

рек в нижние пояса гор, где придерживается зарослей различных ягодных кустарников, плодами

которых питается. Значительную роль в питании краснобрюхой горихвостки в это время занимают ягоды облепихи [5].

Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Ограниченность гнездопригодных территорий. Основной фактор сокращения численности в последнее время – лимит кормовых ресурсов в зимнее время, в связи с бесконтрольной незаконной вырубкой зарослей облепихи при сборе ягод.

Меры охраны. Необходимы целевой мониторинг вида в местах постоянных зимовок, правовая и адресная охрана зарослей кустарников в водоохранных зонах ущелий горных рек.

Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001; 5. Моламусов, 1967.


Составитель И.И. Гизатулин.



Каравайка



Авдотка



Ходулочник

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ «ПТИЦЫ»

Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1989. – 157 с.

Беме Л.Б. Результаты орнитологических экскурсий в Кизлярский округ Дагестанской Республики. Вадикавказ, 1925. – 124 с.

Беме Л.Б. Птицы Северной Осетии и Ингушии // Уч. зап. Северо-Кавказск. ин-та краеведения. Владикавказ, 1926. Т.1. С. 175-271.

Беме Л.Б. Зоологические исследования в Дагестане // Десять лет научной работы Дагестанского НИИ. Махачкала, 1928.

Беме Л.Б. Результаты обследования охотничьего хозяйства Парабочевского и Самурского заказников Н.К.З. Дагестанской С.С. Республики и краткий обзор фауны наземных позвоночных их населяющей // Известия Горского пединститута. Владикавказ, 1929. Т. 6. С. 115-156.

Беме Л.Б. Птицы Северного Кавказа. Пятигорск, 1935.

Беме Л.Б. По Кавказу // Природа и охота. МОИП. М., 1950.

Богданов М.А. Птицы Кавказа // Тр. общества естествоиспытателей при Императорском Казанском ун-те. Казань, 1879, т.8, вып. 4. – 187 с.

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А. О встречах некоторых видов птиц на Кавказском побережье Каспийского моря // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1989. С. 203-204.

Волчанецкий И.Б. Об орнитофауне Предкавказья // III экол. конф. Тезисы докл. 4. Киев, 1954. С. 81-87.

Волчанецкий И.Б. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // Уч. зап. Харьк-го ун-та, 1959, т.106. С. 7-38.

Гизатулин И.И. К состоянию популяции ходулочника на озерах Степная жемчужина // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. Грозный, 1989. С. 118-119.

Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. К фауне куликов Чечено-Ингушетии // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа. Ставрополь, 1989. С. 30-34.

Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. Материалы по редким видам птиц Чечено-Ингушетии // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставрополь, 1990. С. 61-63.

Гизатулин И.И. Гнездование орла-могильника в Чечне и Ингушетии // Королевский орел. М., 1999. С.91-92.

Гизатулин И.И., Ильях М.П. Хищные птицы Чечни и Ингушетии // Кавказский орнитологический вестник. Ставрополь, 2000, вып. 12. С. 48-54.

Гизатулин И.И. К оценке экологической ситуации степей Терско-Кумской низменности // Степи Северной Евразии: Стратегия сохранения природного разнообразия и степного природопользования. Оренбург, 2000. С. 115.

Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильях М.П. Птицы Чечни и Ингушетии. Ставрополь, 2001. – 141 с.

Гизатулин И.И. Урочище Киссык. Инвентаризационное описание участков. Терско-Кумская низменность и южная часть Каспийского побережья Дагестана // Водно-болотные угодья России. М., 2006, т. 6. С. 273-277.

Гизатулин И.И. Озера Капустино, Майорское, Генеральское. Инвентаризационное описание участков. Терско-Кумская низменность и южная часть Каспийского побережья Дагестана // Вод-

но-болотные угодья России. М., 2006 а. Т. 6. С. 270-273.

Гизатулин И.И. Озеро Галанчож. Инвентаризационное описание участков. Горный Кавказ // Водно-болотные угодья России. М., 2006 б. Т. 6. С. 157-160.

Гизатулин И.И., Джамирзоев Г.С. Озера Степная жемчужина. Инвентаризационное описание участков. Терско-Кумская низменность и южная часть Каспийского побережья Дагестана // Водно-болотные угодья России. М., 2006. Т. 6. С. 197-201.

Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильях М.П. Редкие и исчезающие птицы Дагестана и их охрана. Ставрополь, 2000. 145 с.

Иванов Ф.В., Приклонский С.Г. Стрепет в СССР и меры по его охране на зимовке // Орнитология. 1965. Вып. 7. С. 130-133.

Казаков Б.А. Общий обзор фауны /птицы/ // Ресурсы живой фауны. Ростов-на-Дону, 1982. Ч. 2. С. 12-36.

Казаков Б.А., Тильба П.А., Хохлов А.Н., Комаров Ю.Е., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Пишванов Ю.В., Кукиш А.И. Черный аист на Северном Кавказе // Материалы к Красной книге. М., 1990. С. 75-81.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Хохлов А.Н., Тильба П.А., Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Комаров Ю.Е., Поливанов В.М., Емтыль М.Х., Бичерев А.П., Олейников Н.С., Заболотный Н.Л., Кукиш А.И., Мягкова Ю.Я., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Витович О.А., Динкевич М.А., 2004. Птицы Северного Кавказа // Ростов-на-Дону, 2004. Т. 1. – 397 с.

Комаров Ю.Е. Птицы Кизлярского залива и окрестностей // Птицы Северо-Западного Кавказа. М., 1985. С. 159-166.

Красная книга Российской Федерации (животные). Издательство АСТ/Астрель, 2001. – 860 с.

Моламусов Х.Т. Птицы центральной части Северного Кавказа. Нальчик, 1967. – 100 с.

Осмоловская В.И. Вопросы разведения и расселения северокавказского и охотничьего фазанов в СССР // Орнитология. М., 1979. Вып. 14. С. 64-67.

Рашкевич Н.А. Мир пернатых. Грозный, 1980. – 204 с.

Сатунин К.А. Систематический каталог птиц Кавказского края // Зап. Кавк. отдел. Импер-го русского геогр. об-ва. Тифлис, 1911-1912. Кн.28. Вып. 2. – 195 с.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М., 1990. – 726 с.

Точиев Т.Ю. Фауна охотничье-промысловых млекопитающих Чечено-Ингушской АССР, ее охрана и пути рационального использования // Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Баку, 1970.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Летняя орнитофауна Терско-Кумской низменности ЧИАССР // Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1987. С. 71-78.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Малый баклан в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988. С. 55.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Колпица в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988 а. С. 59.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Черный аист в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988 б. С. 62.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Степной орел в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988 в. С. 86.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Могильник в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988 г. С. 86.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Орлан-белохвост в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство. М., 1988 д. С. 96.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Современное состояние фауны курообразных Чечено-Ингушской АССР // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа. Ставрополь, 1989. С. 95-98.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. К фауне журавлеобразных Чечено-Ингушетии // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного

Кавказа, нуждающиеся в охране. Грозный, 1989 а. С. 135-137.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Состояние, экологическое значение и необходимость охраны системы озер Степная жемчужина // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. Грозный, 1989 б. С. 137-139.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Стрепет в Чечено-Ингушской АССР // Итоги изучения редких животных. М., 1990. С. 101-102.

Флинт В.Е., Беме Р.Л., Костин Ю.В., Кузнецов А.А. Птицы СССР. М., 1968. – 637 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об учреждении Красной книги Чеченской Республики».....	6
Часть I. РАСТЕНИЯ	7
ВВЕДЕНИЕ	9
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	12
СПИСОК РЕДКИХ, РЕЛИКТОВЫХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	16
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ	23
Отдел EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ	23
Сем. Equisetaceae Rich. ex LC. – Хвощовые	23
Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ	23
Класс Ophioglossopsysda – Ужовниковые, Офиоглоссопсиды	23
Сем. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh- Ужовниковые	24
Класс Polypodiopsida – Полиподиопсиды	25
Сем. Asplenaceae – Костенцовые	25
Сем. Cryptogrammaeae – Крптограммовые.....	26
Сем. Sinopteridaceae Roidz. – Синоптерисовые	27
Сем. Marsileaceae Mirb. – Марсилиевые	27
Сем. Salviniaceae Dumort. – Сальвиниевые	28
Отдел PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE - ГОЛОСЕМЕННЫЕ	29
Класс Gnetopsida – Гнетовые, или Гнетопсиды	29
Сем. Ephedraceae Dumort. – Эфедровые	29
Класс Pinopsida - Хвойные, или Пинопсиды	31
Сем. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые	31
Сем. Taxaceae S.F. Gray- Тисовые.....	32
Отдел MAGNOLIOPHYTA, ANGIOSPERMAE – ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ	33
Класс MAGNOLIOPSIDA, или DICOTYLEDONES – ДВУДОЛЬНЫЕ	33
Сем. Aceraceae – Кленовые	33
Сем. Adoxaceae Juss. – Адоксовые	34
Сем. Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые	35
Сем. Apiaceae Lindl. – Зонтичные.....	36
Сем. Araliaceae Juss. – Аралиевые.....	37
Сем. Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые	38
Сем. Asclepiadaceae R.Br. – Ластовневые.....	39
Сем. Asteraceae Dumort. – Астровые (Сложноцветные)	40
Сем. Berberidaceae Dumort. – Барбарисовые.....	47
Сем. Betulaceae S.F. Grey – Березовые	47
Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые.....	49

Сем. Brassicaceae Burnatt – Крестоцветные.....	52
Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые	55
Сем. Capparaceae Juss. – Каперцевые	57
Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные.....	58
Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные	59
Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые.....	63
Сем. Cistaceae Juss. – Ладанниковые.....	64
Сем. Corylaceae Mirb. – Лещиновые.....	65
Сем. Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные	65
Сем. Droseraceae Salisb. – Росянковые.....	66
Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые.....	67
Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые.....	68
Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные	69
Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые	71
Сем. Gentianaceae Juss. – Горечавковые	74
Сем. Grossulariaceae Juss. – Крыжовниковые	75
Сем. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные	75
Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые	77
Сем. Nymphaeaceae Salisb. – Нимфейные	78
Сем. Orobanchaceae Vent. – Заразиховые.....	79
Сем. Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые.....	80
Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые	81
Сем. Primulaceae – Первоцветные	82
Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые.....	86
Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные.....	90
Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые	100
Сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые	101
Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые.....	103
Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые	105
Сем. Thymelaeaceae Juss. – Волчниковые	105
Сем. Trapaceae Dumort. – Чилимовые	106
Сем. Ulmaceae Mirb. – Ильмовые	107
Сем. Valerianaceae Batsch – Валериановые	109
Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые	110
Сем. Vitaceae Juss. – Виноградовые	112
Класс LILIOPSIDA, или MONOCOTYLEDONES – однодольные.....	114
Сем. Alliaceae J. Agardh – Луковые	114
Сем. Amaryllidaceae Jaume – Амариллисовые.....	116
Сем. Asphodelaceae – Асфodelиновые	120
Сем. Butomaceae Rich. – Сусаковые	120
Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые.....	121
Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые	122
Сем. Liliaceae Juss. – Лилейные.....	125
Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные	133
Сем. Poaceae Barnhart – Злаковые	144
ВИДЫ РАСТЕНИЙ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	147

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ	149
ЛИТЕРАТУРА	150
УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ВИДОВ РАСТЕНИЙ	155
УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ВИДОВ РАСТЕНИЙ	157
 Часть II. ЖИВОТНЫЕ	159
Введение.....	160
Краткая характеристика фауны Чеченской Республики, состояние ее изученности и стратегия охраны.....	163
Аббревиатуры, сокращения и условные знаки, использованные в тексте	172
 Раздел I. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ	174
Список видов беспозвоночных животных, внесенных в Красную книгу Чеченской Республики	175
Беспозвоночные (краткий очерк)	177
 РАКООБРАЗНЫЕ – Crustacea	179
Отряд Astacidae – Десятиногие раки.....	180
 НАСЕКОМЫЕ – Insecta	181
Отряд Odonata – Стрекозы	182
Отряд Mantodea – Богомолы.....	188
Отряд Orthoptera – Прямокрылые.....	190
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые	192
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые.....	207
Отряд Diptera – Двукрылые	217
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые	218
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые	218
 Литература. Беспозвоночные	241
 Раздел II. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ	246
Список видов позвоночных животных, внесенных в Красную книгу Чеченской Республики	247
Круглоротые и рыбы (краткий очерк)	250
 КРУГЛОРОТЫЕ – Cyclostomata	251
Отряд Petromyzoniformes – Многообразные	252
 КОСТНЫЕ РЫБЫ – Osteichthyes	253
Отряд Asipenseriformes – Осетрообразные	254
Отряд Salmoniformes – Лососеобразные	257
Отряд Cypriniformes – Карпообразные	260
 ЗЕМНОВОДНЫЕ – Amphibia	268
Класс Земноводные, или Амфибии (краткий очерк).....	269
Отряд Caudata – Хвостатые	270

Отряд Anura – Бесхвостые	273
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – Reptilia	278
Класс Пресмыкающиеся (краткий очерк)	279
Отряд Chelonia – Черепахи	280
Отряд Sauria – Ящерицы	281
Отряд Serpentes – Змеи	290
ПТИЦЫ – Aves	308
Класс Птицы (краткий очерк)	309
Отряд Gaviiformes – Гагарообразные	310
Отряд Pelecaniformes – Веслоногие	311
Отряд Ciconiiformes – Аистообразные	314
Отряд Anseriformes – Гусеобразные	319
Отряд Falconiformes – Соколообразные	327
Отряд Galliformes – Куриные	348
Отряд Gruiformes – Журавлеобразные	351
Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные	355
Отряд Strigiformes – СOVOобразные	363
Отряд Passeriformes – Воробьинообразные	364
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – Mammalia	368
Класс Млекопитающие (краткий очерк)	369
Отряд Insectivora – Насекомоядные	370
Отряд Chiroptera – Рукокрылые	373
Отряд Rodentia – Грызуны	381
Отряд Carnivora – Хищные	382
Отряд Artiodactyla – Парнокопытные	397
Литература. Позвоночные	404
Литература к разделу «Круглоротые» и «Костные рыбы»	404
Литература к разделу «Земноводные»	405
Литература к разделу «Пресмыкающиеся»	406
Литература к разделу «Птицы»	412
Литература к разделу «Млекопитающие»	414
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	418
АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ И ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ	424

КРАСНАЯ КНИГА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений и животных**

**ООО «Южный издательский дом»
344022, г. Ростов–на–Дону,
ул. Б.Садовая, 154,
тел./факс (863) 263-30-27,
тел. (863) 291-77-83; 220-39-61
e-mail: skpress@aaanet.ru**

Отпечатано в типографии «Аркол», г. Ростов–на–Дону,
пр. Буденновский, 19а,
Заказ № 1.
тираж 5000 экз.
